



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS

MEDICINA VETERINÁRIA

8 de janeiro de 2017

BOLETIM DE QUESTÕES

Nome: _____ N.º de Inscrição: _____

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Confira se a prova que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique ao fiscal de sala.
- 2 Este **Boletim de Questões** contém 50 questões objetivas, sendo 15 do SUS e 35 de **Área Específica**.
- 3 Confira se, além deste **Boletim**, você recebeu o **Cartão-Resposta**, destinado à marcação das respostas das questões.
- 4 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os dados contidos no **Cartão-Resposta**. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal de sala.
- 5 É imprescindível que você marque as respostas das questões de múltipla escolha no Cartão-Resposta com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, sob pena da impossibilidade de leitura óptica. Na marcação do Cartão-Resposta, você **não** deverá, **sob pena de ter a questão anulada**, utilizar lápis (grafite) e/ou corretivo de qualquer espécie.
- 6 Uma vez entregue pelo fiscal de sala, o Cartão-Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não deverá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo, sob pena de o candidato arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
- 7 O Cartão-Resposta só será substituído se nele for constatado erro de impressão.
- 8 Do Cartão-Resposta não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com mais de uma alternativa marcada, com o uso de corretivo e/ou com marcação feita com caneta de cor e material diferentes daqueles que constam no item 5.
- 9 O tempo disponível para esta prova é de **quatro horas**, com início às **8 horas e término às 12 horas**, observado o horário de Belém/PA.
- 10 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo duas horas após o início da prova.
- 11 Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Boletim de Questões** não serão considerados na avaliação.
- 12 Ao terminar a prova, você deverá devolver ao fiscal de sala o **Boletim de Questões** e o **Cartão-Resposta**, e assinar a lista de presença.



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50.

SUS

- 1 Conforme a Portaria nº 4.279/2010, os fundamentos que precisam ser considerados para assegurar a resolutividade na Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde são
- (A) gestão do cuidado, território circunscrito e existência de complexos reguladores.
 - (B) projeto terapêutico singular, análise da situação de saúde e sistemas de informação.
 - (C) vínculo, escuta, comunicação e responsabilização com o cuidado.
 - (D) economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos.
 - (E) valorização dos trabalhadores de saúde, responsabilização com o cuidado, equipamentos e conhecimento estruturado.
- 2 Quanto à forma como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme estabelecido pela Lei Nº 8.142/1990, analise os itens seguintes.
- I Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta.
 - II Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
 - III Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
 - IV Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- Estão corretos
- (A) I e II, somente.
 - (B) I e III, somente.
 - (C) II e III, somente.
 - (D) II e IV, somente.
 - (E) III e IV, somente.
- 3 Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, é correto afirmar:
- (A) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e assistência farmacêutica.
 - (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. E, a cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.
 - (C) A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas Secretarias Municipais de Saúde.
 - (D) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso para a assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
 - (E) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, conforme a organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



- 4 Quanto à Organização, Direção e Gestão trazidas nas disposições da Lei 8.080/1990, é **INCORRETO** afirmar:
- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
 - (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
 - (C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
 - (D) É vetada aos municípios a constituição de consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
 - (E) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- 5 Na Portaria nº 4.279/2010, encontra-se a seguinte definição: “consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada, sendo complementar (agregando resolutividade e qualidade neste processo)”. Essa definição refere-se à(aos)
- (A) Integração Vertical.
 - (B) Integração Horizontal.
 - (C) Processos de Substituição.
 - (D) Níveis de Atenção.
 - (E) Regiões de Saúde.
- 6 Quanto ao Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, é **INCORRETO** afirmar.
- (A) Traz a humanização do atendimento do usuário como fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde.
 - (B) Apresenta diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa.
 - (C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.
 - (D) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde.
 - (E) Resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestores Regionais.
- 7 Quanto ao Sistema Único de Saúde, marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas.
- () Conforme a Lei Orgânica da Saúde, é campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
 - () O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um princípio do SUS.
 - () A Lei Complementar nº 141/2012, entre outras providências, regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

A sequência correta é

- (A) V, V, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) F, V, F.
- (E) F, V, V.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



- 8 “Na rede de atenção às condições crônicas funciona como centro de comunicação, mas na Rede de atenção às urgências e emergências ela é um dos pontos de atenção”. A assertiva, disposta no anexo da Portaria nº 4.279/2010, corresponde à
- (A) Governança.
 - (B) Linha de Cuidado.
 - (C) Atenção Primária em Saúde.
 - (D) Atenção Secundária em Saúde.
 - (E) Regulação.
- 9 “Estabeleceu o espaço regional como lócus privilegiado de construção das responsabilidades pactuadas, uma vez que é esse espaço que permite a integração de políticas e programas por meio da ação conjunta das esferas federal, estadual e municipal”. O texto faz referência à(ao)
- (A) Mapa de Saúde.
 - (B) Região de Saúde.
 - (C) Pacto Pela Vida.
 - (D) Pacto em Defesa do SUS.
 - (E) Pacto de Gestão.
- 10 **NÃO** é objetivo da Gestão de caso, presente no anexo da Portaria nº 4.279/10:
- (A) Aumentar a qualidade do cuidado.
 - (B) Atender às necessidades e expectativas de usuários em situação especial.
 - (C) Fomentar a fragmentação da atenção.
 - (D) Prover o serviço certo ao usuário no tempo certo.
 - (E) Propiciar uma atenção de qualidade e humanizada.
- 11 Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.488/2011, é correto afirmar que
- (A) as Unidades Básicas de Saúde Fluviais devem possuir identificação específica diferentes aos pactuados nacionalmente para as Unidades Básicas de Saúde.
 - (B) o Município com até 20 mil habitantes e contando com uma a três equipes de Saúde da Família poderá ter até duas equipes na modalidade transitória.
 - (C) equipes de Saúde da Família Ribeirinhas desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais.
 - (D) na Estratégia de Saúde da Família o Agente Comunitário de Saúde deverá acompanhar no máximo 950 pessoas.
 - (E) são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo: definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- 12 “Devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários”. O texto, presente na Política Nacional de Atenção Básica, faz referência à(ao)
- (A) Equipe do Consultório na Rua.
 - (B) Estratégia de Agentes Comunitários.
 - (C) Estratégia de Saúde da Família.
 - (D) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
 - (E) Programa Saúde na Escola.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



- 13 Segundo a Portaria nº 2.488/2011, o(os) _____ deverá(deverão) demonstrar como a aplicação dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a população, incluindo quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de atenção básica. A alternativa que completa o enunciado é
- (A) Consolidado anual das atividades.
 - (B) Demonstrativo detalhado das principais despesas.
 - (C) Demonstrativo sintético de execução orçamentária.
 - (D) Relatórios mensais da origem e da aplicação dos recursos.
 - (E) Relatório de gestão.
- 14 Os fundamentos do Sistema Único de Saúde estão expressos na(no)
- (A) seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal de 1988.
 - (B) Decreto nº 7.508/2011.
 - (C) Lei nº 8.142/1990.
 - (D) Lei Complementar nº 141/2012.
 - (E) Emenda Constitucional nº 29/2000.
- 15 **NÃO** é atributo da Rede de Atenção à Saúde:
- (A) Prestação de serviços especializados em lugar adequado.
 - (B) Participação social ampla.
 - (C) Financiamento bipartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede.
 - (D) Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em saúde.
 - (E) Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico.

MEDICINA VETERINÁRIA

- 16 Um cão da raça boxer macho, de 8 anos, não castrado, foi levado ao atendimento no Hospital Veterinário da UFPA, com dificuldades de micção. O proprietário relata que o paciente vem apresentando dificuldade para urinar, hematuria, febre, também está defecando fezes com forma achatada, anda como tivesse dores no quadril. Diante desta problemática, é correto afirmar:
- (A) O paciente provavelmente apresenta hipoplasia prostática e é recomendado uso de anti-inflamatório sistêmico.
 - (B) O provável diagnóstico é hiperplasia prostática benigna, sendo prostatectomia o tratamento imediato.
 - (C) O paciente pode apresentar hiperplasia prostática benigna, associada a prostatite, sendo nesse caso recomendado omentalização prostática, orquiectomia e terapêutica com finasterida, além da antibioticoterapia.
 - (D) No caso de um cisto prostático, é recomendado somente antibioticoterapia e repetir os exames de imagem.
 - (E) Em caso de hiperplasia prostática benigna, é recomendado o uso de finasterida nesta terapêutica.
- 17 Quanto à castração em animais de companhia, analise as assertivas seguintes.
- I A castração de fêmeas caninas ainda pré-púberes é recomendada para diminuir a incidência de piometra e tumores de mama.
 - II No caso dos machos felinos, o procedimento é recomendado também ainda na pré-puberdade, sem malefício para o paciente.
 - III A terapêutica com progestágeno não é recomendada como método contraceptivo, pois pode induzir a piometra e a tumor de mama, inclusive em felinos.
- Está(ão) correta(s)
- (A) I e II, somente.
 - (B) I e III, somente.
 - (C) II e III, somente.
 - (D) II, somente.
 - (E) I, somente.



**PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016**



- 18 Foi levado para atendimento no Hospital Veterinário da UFPA um canino macho de 7 anos, da raça poodle, criptorquida unilateral, apresentando alopecia simétrica bilateral, atrofia de pênis e prepúcio e leve ginecomastia. Após exame ultrassonográfico, observou-se aumento de volume do testículo que permaneceu na cavidade abdominal. Diante desse caso, é correto afirmar:
- (A) O mais provável é que se trate de um caso de sertolioma, devido às características clínicas e ocorrência.
 - (B) O mais provável é que se trate de um caso de Leydigocitoma, devido às características clínicas e ocorrência.
 - (C) O mais provável é que se trate de um caso de seminoma, devido às características clínicas e ocorrência.
 - (D) O mais provável é que se trate de um caso de alopecia por dermatite, e a alteração deve ser um caso de orquite.
 - (E) Deve ser simplesmente um caso de criptorquidia, com dermatite de origem adrenal.
- 19 Um médico veterinário foi chamado para atender no hospital veterinário um cão da raça Golden, de 7 anos, pesando 37kg, que se apresenta prostrado, com taquipneia, mucosas congestas, abdome abaulado. O proprietário relata que o paciente apresentou esse quadro por volta das 20h30, antes ele estava normal, tinha comido às 18 h e estava brincando com outro cão no quintal. Diante dessas informações, é correto afirmar:
- (A) Deve ser um caso de intussuscepção, geralmente de maior ocorrência pelos sinais clínicos.
 - (B) É mais provável que seja um caso de volvo gástrico, sendo uma gastrocentese o mais indicado para a terapêutica.
 - (C) Deve-se tratar de volvo intestinal, comum nestes casos, principalmente para esta raça.
 - (D) O mais provável é que seja um caso de gastrite crônica e o tratamento deve ser a longo prazo, com medicações que vão diminuir o pH estomacal.
 - (E) O mais recomendado neste caso é o acesso cirúrgico abdominal, e desfazer o volvo, seguido de gastropexia.
- 20 Foi levado para atendimento no hospital veterinário um canino, fêmea, da raça teckel, de 9 meses, apresentando prostração, grande sensibilidade abdominal e tenesmo. O proprietário suspeita de possível ingestão de um brinquedo de cordinha. Após exame ultrassonográfico abdominal, observou-se uma estrutura com multicamadas, com sobreposição de segmentos intestinais. Diante do caso, é correto afirmar:
- (A) Pelas características imaginológicas descritas, trata-se de um caso de corpo estranho gástrico, sendo necessária a retirada por gastroscopia ou gastrotomia.
 - (B) O mais provável é que seja um caso de intussuscepção, sendo necessária a reposição e uma duodenopexia, caso se trate de corpo estranho na porção inicial do intestino delgado.
 - (C) Pela característica imaginológica, conhecida como “anel concêntrico”, trata-se um caso de intussuscepção.
 - (D) É um caso de corpo estranho intestinal seguido de intussuscepção, podendo ser retirado por endoscopia.
 - (E) É um caso de corpo estranho intestinal, mais comum nesse tipo de objeto, que tenha se alojado na porção final do cólon menor.
- 21 Em um caso de distocia, depois de todas as avaliações, verificou-se a necessidade de cesariana em uma cadela SRD de 18 kg, 4 anos. Sobre este caso, é correto afirmar:
- (A) Caso o proprietário deseje manter a capacidade reprodutiva da paciente, a histerorrafia pode ser feita com sultan e cushing.
 - (B) Caso seja confirmada morte fetal no exame obstétrico, pode-se fazer ovário-histerectomia em bloco pela técnica das três pinças.
 - (C) O útero deve ser acessado apenas através de incisões no corno gravídico.
 - (D) Em caso de mais de 6 horas de sinal de parto, a cesariana é a primeira opção.
 - (E) A castração sempre é recomendada após o procedimento.
- 22 Sobre um caso recorrente de obstrução uretral em macho felino, é correto afirmar:
- (A) Pode ocorrer por alimentação inadequada e pouca ingestão de água, mas a castração do macho ainda quando jovem é um fator importante na fisiopatogenia.
 - (B) Geralmente a cirurgia de penectomia com uretroplastia é recomendada já no primeiro caso de obstrução.
 - (C) A penectomia é uma cirurgia recomendada, sem complicações para a sobrevivência do paciente.
 - (D) Em casos de machos não castrados, é recomendada a orquiectomia.
 - (E) Em casos da necessidade de penectomia com uretroplastia, não é preciso manter o paciente sondado no pós-operatório.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



- 23 Foi levada para atendimento uma cadela de 4 anos com comportamento reprodutivo atípico. O proprietário relata que esta apresenta cio com um intervalo aproximado de 6 meses, mas ressalta que já foi castrada. Sobre esse caso, é correto afirmar:
- (A) O mais provável é que a paciente tenha desenvolvido um comportamento atípico, necessitando observar os níveis hormonais.
 - (B) O mais provável é que a paciente seja portadora da “Síndrome do ovário remanescente” (SOR), podendo ter como única causa, um erro de técnica cirúrgica no momento da ovário-histerectomia.
 - (C) Nesse caso, provavelmente se observarão, no momento do estro, estruturas hiperecoicas, circulares próximas ao rim direito, esquerdo ou em ambos.
 - (D) Nesse caso se recomenda uma celiotomia exploratória ou uma celioscopia, sendo a terapêutica já em seguida desta avaliação, no próprio transoperatório.
 - (E) O mais provável é que a paciente tenha desenvolvido uma neoplasia de epífise, que esteja causando este transtorno.
- 24 Sobre as técnicas cirúrgicas aplicadas ao trato reprodutor em pequenos animais, é correto afirmar:
- (A) Ovariohisterectomias (OHs) eletivas requerem antibioticoterapia no pós-operatório, mesmo quando respeitados os princípios de cirurgia asséptica.
 - (B) A síntese de uma episiotomia deve ser realizada em dois planos: o primeiro abrange as camadas mucosa, submucosa e muscular, com fio não absorvível, padrão em “X”; o segundo abrange a pele em “U” deitado.
 - (C) A castração (orquiectomia) em gatos jovens pode predispor à síndrome urológica obstrutiva, porém deve ser realizada em todos os animais.
 - (D) A técnica das 3 pinças para OH em cadelas visa auxiliar na realização das ligaduras pediculares e evitar hemorragia, podendo ser as três posicionadas no pedículo ovariano ou duas no pedículo e uma entre o ovário e o útero.
 - (E) Para se alcançar melhor exposição do pedículo ovariano, deve-se fazer a ruptura do ligamento próprio do ovário; para melhor exposição do corpo uterino, realiza-se dissecação/ruptura dos ligamentos largos do útero.
- 25 Sobre os procedimentos de esterilização cirúrgica em animais de companhia, é correto afirmar:
- (A) É possível fazer a castração pré-púbere de todos os cães e gatos saudáveis.
 - (B) O acesso mais usual para orquiectomia em cães e gatos é na porção mais distal do escroto.
 - (C) A ovariohisterectomia é a única opção cirúrgica de “castração” para pet’s fêmeas.
 - (D) Em felinos só é possível fazer orquiectomia com hemostasia por síntese com fio cirúrgico.
 - (E) Em casos de lesões neoplásicas em escroto, recomenda-se orquiectomia com ablação escrotal.
- 26 Sobre um paciente canino macho de 8 anos, com cálculo em bexiga confirmado pelos exames de imagem, analise as afirmativas seguintes.
- I A síntese deve ser feita em duas camadas da bexiga, com fio sintético absorvível, 4-0 ou 5-0.
 - II A síntese deve ser feita em duas camadas da bexiga, com a 1ª camada na seromucosa, e a 2ª camada sendo seromuscular com eversão seguida de omentopexia.
 - III A síntese deve ser feita em duas camadas da bexiga, a 1ª camada seguindo um padrão contínuo simples, e a 2ª camada com Cushing ou Lembert.
- Está(ão) correta(s):
- (A) I, somente.
 - (B) II, somente.
 - (C) III, somente.
 - (D) I, II e III.
 - (E) I e II, somente.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



27 Sobre o complexo respiratório felino, é correto afirmar.

- (A) Os sinais clínicos incluem febre, espirros, secreção nasal, conjuntivite, anorexia e desidratação. Os gatos tornam-se acometidos quando entram em contato com animais doentes, portadores ou fômites.
- (B) O vírus da rinotraqueíte felina causa principalmente ulcerações orais, pneumonia intersticial branda e poliartrite.
- (C) O calicivírus causa principalmente úlcera de córnea, aborto e morte neonatal.
- (D) Os gatos, após a cura da doença, tornam-se portadores do vírus por uma semana, por isso deve-se evitar contato com outros gatos durante esse período para evitar o contágio da doença.
- (E) Todas as afirmativas citadas estão corretas.

28 Sobre a bronquite felina, analise as sentenças seguintes.

- I É uma doença respiratória comum em gatos, podendo causar tosse, chiados e episódios de angústia respiratória. Pode estar associada com a presença de alérgenos no ambiente.
- II O diagnóstico é feito com base no histórico, exame físico e radiografias torácicas, que apresentam principalmente um padrão bronquial. Apesar disso, achados radiográficos normais podem ser observados em gatos com bronquite. Lavados traqueais também devem ser realizados e descartada a hipótese de dirofilariose.
- III Animais com angústia respiratória aguda devem ser tratados imediatamente com glicocorticoides de ação rápida, como o succinato sódico de prednisolona, oxigenoterapia, broncodilatadores, além de ser mantidos em ambiente tranquilo e refrigerado.

Está(ão) correta(s)

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I, II e III.
- (E) I, somente.

29 Um pinscher de 10 anos chega ao Hospital Veterinário com queixa de tosse. Quanto ao assunto, analise as sentenças seguintes.

- I O colapso traqueal é um diagnóstico diferencial para tosse, que piora quando o animal se agita ou com o uso de coleira no pescoço. Ele pode acontecer na porção cervical ou torácica. A radiografia na inspiração deve ser realizada quando se suspeita de colapso intratorácico, e na expiração quando a suspeita é de colapso cervical.
- II A degeneração mixomatosa da válvula mitral também é um diagnóstico diferencial para tosse. A regurgitação valvular provoca aumento atrial esquerdo e compressão do brônquio principal esquerdo, levando a tosse. O edema pulmonar resultante da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) também pode ser a causa da tosse.
- III A bronquite crônica canina, apesar de menos frequente, também deve ser considerada como diagnóstico diferencial; neste caso, a tosse pode ser produtiva ou não. A dispneia, quando presente, é expiratória.
- IV A dirofilariose também pode causar tosse em alguns animais, além de fadiga, dispneia ao exercício e ICC.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) I, II e III, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.



**PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016**



30 Uma cadela de 8 anos chega ao Hospital Veterinário com desidratação e queixa de apatia, poliúria, polidipsia e vômito. Quanto a esse caso, analise as sentenças seguintes.

- I Um diagnóstico diferencial é a hiperplasia endometrial cística – piometra, que acontece quando a progesterona estimula o crescimento e atividade secretora das glândulas endometriais e depois há contaminação bacteriana secundária.
- II Outro diagnóstico diferencial é a diabetes melitus complicada pela cetoacidose diabética. A poliúria nesse caso é causada pela alta produção do hormônio insulina, que não consegue ser absorvido e sai pela urina, carregando uma molécula de água.
- III Os exames hemograma e urinálise ajudariam a diferenciar entre os dois diagnósticos, sendo que possivelmente haveria leucocitose em caso de piometra e cetonúria no caso da cetoacidose diabética.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

31 Quanto à poliúria/polidipsia, analise as sentenças seguintes.

- I Diabetes insípido pode ter origem central ou nefrogênica, sendo que a primeira é caracterizada pela deficiência de produção do hormônio antidiurético (ou AVP) e a segunda pela ausência de receptores renais para tal hormônio.
- II Animais com hiperadrenocorticismos também podem ter poliúria-polidipsia. Esta doença é caracterizada pela produção exagerada de glicocorticoide, sendo os tumores da glândula adrenal a maior causa dessa doença.
- III A insuficiência renal crônica é outra causa de poliúria-polidipsia. É uma condição onde já houve perda de mais de 75% dos néfrons e os rins não são mais capazes de manter a densidade urinária.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

32 Sobre a piometra, é correto afirmar:

- (A) A aplicação de anticoncepcionais à base de estrógenos predispõe à piometra, pois o estrógeno aumenta o número de receptores de progesterona no útero.
- (B) A piometra ocorre principalmente durante o estro, fase do ciclo em que há predominância de progesterona.
- (C) As cadelas com piometra podem ser predispostas à necrose tubular aguda, em que o principal achado diagnóstico é a presença de proteinúria.
- (D) O tratamento clínico da piometra é realizado com altas dosagens de antibióticos e hormônio luteinizante para eliminar o conteúdo uterino.
- (E) O tratamento cirúrgico imediato é indicado em todos os casos.



33 Sobre a cistite bacteriana em cães, analise as sentenças seguintes.

- I A cistite bacteriana pode predispor a formação de cálculos de oxalato de cálcio por acidificar a urina.
- II Sinais clínicos, como disúria, polaciúria e estrangúria, estão sempre relacionados com alterações do trato urinário inferior, como a cistite, e nunca devem ser confundidos com doenças renais.
- III A cistite bacteriana deve ser tratada por um antibiótico escolhido com base no cultivo e antibiograma da urina, e o tempo máximo de tratamento deve ser de 7 dias.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

34 A doença do trato urinário inferior de felinos (DTUIF) é bastante diagnosticada na clínica de pequenos animais. Quanto ao assunto, analise as sentenças seguintes.

- I Polaciúria, hematúria, disúria, estrangúria são sinais clínicos do DTUIF que podem acometer gatos machos ou fêmeas.
- II A DTUIF na forma obstrutiva é uma urgência, dependendo da condição clínica do gato afetado. Se a desobstrução não for possível por massagem peniana, o gato deve ser sedado para se fazer a desobstrução uretral com auxílio de sonda, lubrificantes e solução salina, de forma estéril.
- III Animais muito deprimidos podem apresentar hipercalemia e alterações eletrocardiográficas decorrentes desse desequilíbrio eletrolítico, como bradicardia, intervalo PR prolongado e arritmias. Esses animais devem ser hidratados com solução salina e receber insulina, seguida de glicose, além de gluconato de cálcio.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

35 Sobre as doenças renais, analise as sentenças seguintes.

- I A insuficiência renal crônica é a doença renal que mais acomete cães e gatos idosos.
- II A necrose tubular aguda pode ser causada por toxinas ou até mesmo medicamentos. Animais desidratados estão mais predispostos a desenvolverem essa doença renal. Anúria ou a presença de inúmeros cilindros na urinálise são achados da necrose tubular aguda.
- III A glomerulonefrite é uma doença renal caracterizada pela lesão glomerular devido a uma isquemia renal, como acontece quando há baixa pressão arterial ou em casos de hemorragias intensas.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



36 Sobre a insuficiência pancreática canina, analise as sentenças seguintes.

- I As principais enzimas digestivas estão presentes nas células acinares de forma inativa. Na insuficiência pancreática, a ativação dessas enzimas dentro do pâncreas provoca sua autodigestão.
- II Os principais sintomas da insuficiência pancreática exócrina são perda de peso crônica, apetite voraz e fezes volumosas e amolecidas.
- III O tratamento é à base de antibióticos por mais de 30 dias, além de hidratação com ringer lactato.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

37 Sobre as dermatites parasitárias, analise as sentenças seguintes.

- I O ácaro *Demodex canis* é um residente normal da pele canina. A transmissão ocorre da cadela para os lactentes por contato direto durante os primeiros dias de vida do filhote.
- II A *Cheyletiella* ou “caspa andante” é um ácaro que vive na superfície da pele. Pode acometer cães, gatos, coelhos e humanos e provoca uma dermatite pruriginosa.
- III A sarna sarcóptica ou escabiose canina também é causada por um ácaro que escava galerias no estrato córneo da pele e deposita seus ovos em túneis atrás das galerias. Os locais mais afetados são porções ventrais do abdome, tórax e membros, sendo as orelhas e cotovelos os locais favoritos dos ácaros.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

38 A queixa de prurido no corpo é uma das mais comuns no atendimento veterinário. Entre suas principais causas estão as doenças parasitárias e alérgicas. Quanto ao assunto, analise as sentenças seguintes.

- I A atopia canina é uma doença de difícil controle. Está relacionada com a produção desordenada de IgA (imunoglobulina A) na pele dos animais acometidos. É a principal causa de prurido em cães.
- II A hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar é um distúrbio cutâneo não sazonal. O alérgeno geralmente é uma glicoproteína presente no alimento. O diagnóstico é feito com dieta de eliminação.
- III A hipersensibilidade à picada de pulga é uma dermatite pruriginosa papular bastante comum em cães. O prurido crônico leva a alopecia, liqueificação e formação de crostas, tipicamente em região lombossacra dorsal, coxas caudomediais, abdome ventral e flancos.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



39 Sobre as otites em cães, analise as sentenças seguintes.

- I As doenças alérgicas são importantes fatores primários no surgimento das otites. Para o sucesso do tratamento, esses fatores devem ser reconhecidos e tratados.
- II A otoscopia deve ser realizada com critério, apenas nos casos de otite com suspeita de ruptura de tímpano.
- III Oto-hematoma é um achado comum, sempre secundário a um quadro de otite. Ele é decorrente da ruptura de vasos na orelha quando o animal balança a cabeça com força ou se coça. A resolução do oto-hematoma é cirúrgica, além do tratamento da otite.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

40 Sobre a fenda palatina congênita em cães, analise as afirmativas abaixo.

- I Os sinais clínicos podem incluir dificuldade de mamar, descarga nasal, déficit no desenvolvimento, espirro e tosse.
- II Técnicas para a correção do defeito palatino podem incluir o retalho bipediculado ou sobreposição de retalho.
- III A não inclusão da artéria palatina maior ao retalho bipediculado poderá resultar na necrose deste.
- IV No caso de pacientes pediátricos, o período de jejum pré-operatório deve ser curto.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I, II e III, somente.
- (C) II, III e IV, somente.
- (D) II e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

41 Em relação às cirurgias do trato urinário, complicações pós-operatórias podem ocorrer. Quanto a essas complicações, analise os itens seguintes.

- I Vazamento vesical decorrente de procedimentos de cistotomia.
- II Favorecimento da formação de cálculo vesical quando empregados fios não absorvíveis nos procedimentos na cistorrafia.
- III Incontinência urinária nos casos de lesão iatrogênica do nervo podendo em procedimentos de uretostomia no gato.

Está(ão) correto(s)

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) II, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III, somente.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



- 4.2 A expansão do estômago associada à rotação em seu eixo mesentérico é definida como dilatação vólculo-gástrica (DVG). Sobre essa enfermidade, analise as afirmativas abaixo.
- I A estase vascular pode causar redução da produção de ácido láctico e alcalose metabólica.
 - II A acidose respiratória pode ser decorrente da hipoventilação secundária à compressão gástrica sobre o diafragma, com redução da complacência pulmonar.
 - III Para evitar a recorrência de DVG, pode-se realizar a gastropexia.
 - IV Arritmias ventriculares podem ocorrer em casos de DVG, sendo o cloridrato de lidocaína um antiarrítmico que pode ser empregado nessas situações.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

- 4.3 Sobre os procedimentos cirúrgicos empregados no jejuno, analise as afirmativas seguintes.

- I O padrão de enterorrafia é a sutura simples interrompida, englobando todas as camadas do intestino.
- II Nos procedimentos de enterotomia, as incisões longitudinais na borda antimesentérica podem ser suturadas transversalmente para minimizar a ocorrência de estenose intestinal.
- III A hipoproteinemia não interfere no processo de cicatrização intestinal.
- IV A ressecção de grandes segmentos do jejuno pode levar o paciente ao desenvolvimento da síndrome do intestino curto.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) I, II e IV, somente.
- (D) I, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

- 4.4 Nos casos clínicos em que o paciente apresenta acidose metabólica, espera-se como resposta compensatória:

- (A) Taquipneia e retenção de bicarbonato pelos rins.
- (B) Bradipneia e retenção de bicarbonato pelos rins.
- (C) Ausência de alterações de esforço respiratório, porém com retenção de bicarbonato pelos rins.
- (D) Ausência de alterações de esforço respiratório, porém com eliminação de bicarbonato pelos rins.
- (E) Taquipneia e aumento da eliminação de bicarbonato pelos rins.

- 4.5 Sobre a oxigenoterapia para pacientes com desconforto respiratório, analise as afirmativas seguintes.

- I A oxigenoterapia mantém a pressão parcial de oxigênio superior a 60mmHg.
- II O fornecimento de oxigênio a 100% pode ocasionar efeitos tóxicos ao paciente.
- III A oxigenoterapia eleva a oferta de O₂ aos tecidos, se não houver obstrução de vias aéreas.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016



46 A curva de dissociação de oxiemoglobina possui um formato sigmoide e apresenta a relação entre os níveis de hemoglobina saturada e a pressão parcial de oxigênio. Quanto aos fatores que podem influenciar no deslocamento para a esquerda ou para direita dessa curva, analise os itens seguintes.

- I Nível do pH sanguíneo.
- II Temperatura corporal.
- III Concentração de 2,3- difosfoglicerato.

Está(ão) correto(s)

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, somente.
- (E) III, somente.

47 Sobre a enterite por parvovírus canino, analise as afirmativas abaixo.

- I Existem dois tipos de vírus, o parvovírus canino Tipo I e o Tipo II, no entanto apenas o Tipo II é responsável pela sintomatologia clássica de parvovirose.
- II São comuns os quadros de translocação bacteriana por lesão da mucosa intestinal.
- III O eletrólito de maior relevância clínica nos casos de parvovirose é o potássio.
- IV A base terapêutica suporte da parvovirose inclui: fluidoterapia, reposição de eletrólitos, antibióticos, antieméticos, antiácidos e terapia nutricional especial.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) II e III, somente.
- (C) II e IV, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

48 Com base nas doenças cardíacas, analise as afirmativas seguintes.

- I Na insuficiência cardíaca congestiva esquerda, é comum o desenvolvimento de ascite.
- II Manifestações clínicas da doença cardíaca podem incluir tosse, síncope e dispneia.
- III A lidocaína é eficaz contra arritmias supraventriculares.

Está(ão) **INCORRETA(S)**

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) III, somente.
- (E) I, II e III.

49 Quanto ao eletrocardiograma (ECG), analise as afirmativas seguintes.

- I A onda "T" representa a repolarização atrial.
- II O ECG representa graficamente a despolarização e a repolarização do músculo cardíaco.
- III O complexo "QRS" representa a despolarização ventricular.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) III, somente.
- (E) I, II e III.



**PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016**



50 As obstruções do trato gastrointestinal por corpo estranho podem necessitar de tratamento cirúrgico. Em relação aos casos em que há perfuração de alça intestinal por objetos perfurocortantes, analise as afirmativas seguintes.

- I A estabilização primária do paciente quanto ao quadro de choque hemorrágico ou séptico é fundamental para o tratamento.
- II A lavagem da cavidade abdominal pode ser realizada com solução fisiológica ou ringer com lactato aquecida.
- III Deve-se realizar a sutura diretamente na ferida do local da perfuração.
- IV O paciente deve ser submetido ao jejum de 72 horas após o tratamento cirúrgico.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) II e III, somente.
- (C) I, III e IV, somente.
- (D) II e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.