

ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL

Questão 2

Deferido o recurso.

- RECURSO PROCEDENTE
- QUESTÃO ANULADA

Questão 4

A resposta é alcalose respiratória.

Quando falamos em distúrbio esperado fica claro que só poderemos avaliar esse “esperado” por meio de gasometria arterial. Em segundo lugar, em que pese a hipovolemia induzir à hipoperfusão e esta à acidez celular, os mecanismos PRECOSES de compensação estão relativos à transformar esse excesso de ácido em ácido carbônico (com menor poder de dissociação), o qual será transformado (a nível pulmonar) em CO₂ e H₂O, na tentativa de eliminar valências ácidas. Há aumento da frequência respiratória e eliminação maior de CO₂, induzindo Alcalose respiratória. Somente quando esse mecanismo não consegue mais promover compensação, detecta-se a acidose metabólica.

Indeferido o recurso.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 7

O candidato demonstra um completo desconhecimento da matéria, pois “Janela Pericárdica” nunca foi sinônimo de “Endoscopia Digestiva Alta”.

Por outro lado, o paciente encontra-se estável e não instável como equivocadamente afirma o candidato em seu recurso.

Indeferido o recurso.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 12

Indeferido o recurso.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 15

De acordo com o enunciado da questão a única opção em que há possibilidade da ocorrência de contra-indicação para nutrição enteral são as fístulas do trato gastrointestinal alto como as enterocutâneas, principalmente aquelas envolvendo o intestino delgado proximal. As limitações para a inserção de sondas distais ao orifício fistuloso limitam bastante a introdução de dieta enteral, tendo em vista que irá aumentar a vasão pelo orifício fistuloso proporcionando maior perda de líquidos, eletrólitos e nutrientes. Nesse cenário, a conduta inicial é o suporte nutricional parenteral, até porque a pergunta não estava restrita aos casos raros de fístulas de baixo débito.

Kumpf et al. ASPEN-FELANPE Clinical Guidelines: Nutrition Support of Adult Patients With Enterocutaneous Fistula. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2016, Volume XX Number X.

Lloyd et al. Nutrition and management of enterocutaneous fistula. British Journal of Surgery 2006; 93: 1045–1055.

Indeferido o recurso.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 16

Apesar do uso cada vez mais restrito das cefalosporinas de terceira geração nos casos de necrose pancreática infectada, tendo em vista que existem opções melhores de tratamento, há de se considerar que drogas como a ceftriaxone ainda são utilizadas em algumas instituições, embora tenha limitações para o controle de germes multirresistentes de origem hospitalar. Como a pergunta deixou dúvida quanto ao tipo de flora envolvida, cabe considerar a **anulação da questão** pela ocorrência de 2 respostas corretas.

Sartelli et al. Antimicrobials: a global alliance for optimizing their rational use in intra-abdominal infections (AGORA). World Journal of Emergency Surgery (2016) 11:33

Deferido o recurso.

- RECURSO PROCEDENTE

- QUESTÃO ANULADA

Questão 20

Indeferido o recurso.

- RECURSO IMPROCEDENTE