



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS



CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 10, DE 10 DE JANEIRO DE 2022

MÉDICO

ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

13 DE MARÇO DE 2022

Nome: _____ Nº de Inscrição: _____

BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 06 de Legislação, 04 de Raciocínio Lógico e 30 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras **(A)**, **(B)**, **(C)**, **(D)** e **(E)**, das quais apenas uma é correta.
- 2 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. **Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.**
- 3 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 4 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo e não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo.
- 5 O CARTÃO-RESPOSTA somente será substituído caso contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**. O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas.
- 6 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, **no mínimo, 2 (duas) horas** após o início da prova. Quando terminar a prova, assine a LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
- 7 O tempo disponível para a prova é de **quatro horas, com início às 14h30 horas e término às 18h30 horas**, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova.
- 8 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão de afastamento do candidato da sala de prova ou para preenchimento do seu CARTÃO-RESPOSTA ou de outros formulários. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Somente será permitido ao candidato levar o seu Boletim de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova.



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 50

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10.

Ciência e política em tempos de negacionismo

01 Compreender os fatores que culminaram na decisão de vários governantes de voltar às
02 ruas antes do tempo recomendado para enfrentar a pandemia do coronavírus demanda uma
03 análise cuidadosa.

04 Uma matéria do jornal O Globo, publicada em 11 de junho de 2020, tratava da
05 impressionante multidão atraída aos shoppings do Rio de Janeiro, reabertos à frequência
06 naquele mesmo dia. Muitos ficaram assombrados – não sem razão – pela decisão da prefeitura
07 de permitir a reabertura dos estabelecimentos comerciais num momento em que a pandemia
08 estava ainda longe de ser controlada. Mas, justamente porque tantos de nós já não esperamos
09 coerência ou proteção desses governantes, o que aparentemente causou mais espanto foi a
10 avidez com que tantas pessoas responderam ao chamado de “retorno à normalidade”, mesmo
11 com os números de infectados e mortos aumentando.

12 Nesse contexto, a frase dita por um dos entrevistados na reportagem, que aguardava
13 pacientemente na fila para entrar no shopping, pode soar atordoante: “É engraçado: sou contra,
14 mas estou aqui. Acho que o shopping é lazer, bem-estar, conforto e segurança. Mesmo vindo,
15 acho que não era o momento da reabertura. Estamos em uma situação crítica e acredito que vai
16 aumentar o número de casos. Mesmo assim, a gente é tentado a vir”.

17 O testemunho expressa desorientação, de fato, mas não ignorância. As narrativas da
18 ciência são ouvidas, mas não bastam para induzir comportamentos. Esse é o nó. Vivemos tempos
19 em que sinais contrários são emitidos todo o tempo, evidenciando um conflito de autoridade.

20 Nossa hipótese é a de que não há déficit de conhecimento ou de saber atuando como
21 pressuposto dessas ações: as pessoas sabem dos riscos, mas o que explica a contradição entre
22 o que elas sabem e fazem é uma “incompatibilidade de mundos”.

23 Essa defasagem se estabelece não apenas entre as diferentes classes sociais, mas
24 também no interior delas, com a crescente cisão que a chamada “crise da democracia” vem
25 provocando entre nossas vidas privadas – incluindo nossas relações mais próximas – e nosso
26 senso de pertencimento a uma coletividade ampliada (a sociedade). Essa crise da democracia,
27 evidentemente, reverbera nas instituições que a sustentam, o que não exclui a ciência. É assim
28 que suas verdades não têm conseguido engajar a maioria das pessoas num projeto comum, não
29 têm contribuído para a construção de um tecido social coeso, não têm servido de ponte para
conectar necessidades e desejos individuais a projetos coletivos.

Disponível em <https://cienciahoje.org.br/artigo/ciencia-e-politica-em-tempos-de-negacionismo/>

Acesso em 22/01/22. Texto Adaptado.

- 1** De acordo com o texto, a população em geral
- (A)** desacredita na ciência.
 - (B)** ignora o conhecimento científico.
 - (C)** desconfia da ciência.
 - (D)** abomina tudo o que é científico.
 - (E)** deixou de aderir ao conhecimento científico.



- 2** O texto sugere que “a decisão dos governantes de voltar às ruas antes do tempo recomendado” foi
- (A) descabida.
 - (B) previsível.
 - (C) impressionante.
 - (D) incoerente.
 - (E) atordoante.
- 3** O uso de crase na expressão “às ruas” (linhas 01 e 02) se justifica pela mesma regra utilizada em
- (A) à luz da justiça, somos todos iguais.
 - (B) é sempre emocionante retornar à terra natal.
 - (C) é imprescindível a adequação às normas sociais.
 - (D) a violação às regras do jogo não é aceitável.
 - (E) às vezes, tudo o que se precisa é de paz interior.
- 4** O uso de travessões no trecho “não sem razão” (linha 6) se justifica por indicar
- (A) comentário do autor do texto.
 - (B) diálogo no interior do texto.
 - (C) substituição de vírgulas.
 - (D) supressão de parênteses.
 - (E) recurso estilístico.
- 5** A palavra “bem-estar” apresenta hífen seguindo a mesma regra que a usada em
- (A) anti-inflamatório.
 - (B) extra-humano.
 - (C) ex-diretora.
 - (D) tira-teima.
 - (E) pan-americano.
- 6** A expressão “retorno à normalidade” (linha 10) está entre aspas para sinalizar que se trata de um(uma)
- (A) expressão enfática.
 - (B) exemplar de discurso indireto.
 - (C) forma de discurso direto.
 - (D) caso de ironia.
 - (E) caso de estrangeirismo.
- 7** “Essa defasagem” (linha 23) diz respeito, principalmente,
- (A) ao descompasso entre ciência e sociedade.
 - (B) à diferença entre as classes sociais.
 - (C) ao grave problema da crise democrática.
 - (D) aos efeitos do negacionismo na sociedade.
 - (E) aos efeitos negativos nas nossas relações pessoais.
- 8** A palavra “cisão” (linha 24) significa
- (A) concessão.
 - (B) deterioração.
 - (C) aglomeração.
 - (D) separação.
 - (E) polarização.



9 No texto, a expressão “suas verdades” (linha 28) refere-se à(às)

- (A) coletividade.
- (B) sociedade.
- (C) democracia.
- (D) instituições.
- (E) ciência.

10 A palavra “negacionismo”, tal como usada no texto, ilustra um caso de

- (A) estrangeirismo.
- (B) silogismo.
- (C) neologismo.
- (D) anacronismo.
- (E) paralelismo.

LEGISLAÇÃO

11 No provimento derivado por reingresso, o servidor retorna ao serviço ativo do qual estava desligado. Sobre a modalidade de provimento derivado na forma reversão, é correto afirmar:

- (A) A reversão de ofício é o retorno do servidor aposentado por invalidez para ocupar outro cargo compatível com o seu novo estado.
- (B) A reversão a pedido ocorre quando o servidor aposentado compulsoriamente requer à administração o retorno ao cargo de origem.
- (C) A reversão de ofício é ato vinculado que só não será realizado caso o servidor tenha completado 70 anos.
- (D) Na reversão de ofício, mesmo não havendo cargo vago, o servidor ocupará o cargo de origem.
- (E) Na reversão a pedido, não há necessidade de serem preenchidos requisitos cumulativos para ser solicitada.

12 A Lei 8.112/90 denomina de vantagens qualquer valor recebido pelo servidor que não se enquadre na definição de vencimento. Sobre as vantagens que recebem os servidores públicos, é correto afirmar:

- (A) As indenizações não integram a remuneração. Os adicionais integram a remuneração. E as gratificações se incorporam apenas nos vencimentos, ficando excluídos de tal incorporação os proventos.
- (B) As indenizações visam a recompor o patrimônio do servidor que sofreu uma redução em decorrência do regular exercício de suas funções.
- (C) O valor pago a título de ajuda de custo é calculado sobre os vencimentos do servidor, não podendo exceder a importância correspondente a 03 (três) meses de vencimentos.
- (D) As diárias são devidas ao servidor público que se desloca, seja em caráter temporário ou permanente.
- (E) O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia, e, no caso de falecimento do servidor, o auxílio-moradia continuará sendo pago por até 3 meses.



- 13** O servidor público faz jus a licenças por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas. Sobre as licenças por motivo de doença em pessoa da família, é correto afirmar:
- (A)** A concessão de licença e suas prorrogações serão sempre precedidas por perícia médica oficial. Contudo, esta poderá ser dispensada se a licença for inferior a 15 dias, dentro de um ano, na forma definida em regulamento.
 - (B)** Durante o período da licença, é facultado ao servidor o exercício de atividade remunerada.
 - (C)** A licença, incluídas suas prorrogações, poderá ser concedida, por até 90 (noventa dias) consecutivos, ou não, mantida a remuneração do servidor.
 - (D)** A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as prorrogações, não poderá ultrapassar os 60 dias consecutivos, se mantida a remuneração, ou os 90 dias consecutivos, também mantendo-se a remuneração.
 - (E)** O tempo de licença não remunerada que exceder a trinta dias em um período de 12 meses não é contado para nenhum efeito.
- 14** Sabe-se que os instrumentos de apuração da responsabilidade dos servidores públicos por infrações praticadas no exercício de suas atribuições consistem em administrativo disciplinar – PAD ou nas sindicâncias. Sobre esses instrumentos, é correto afirmar:
- (A)** A instauração de processo administrativo disciplinar – PAD dá-se pela publicação de portaria de designação de comissão encarregada de proceder aos trabalhos de investigação e culmina com a apresentação de relatório final conclusivo sobre a procedência ou não das acusações levantadas, a qual a autoridade julgadora deve acatar, mesmo sendo apresentadas as provas em contrário.
 - (B)** O servidor que estiver respondendo a um PAD só poderá ser exonerado “de ofício”.
 - (C)** O servidor investigado será temporariamente afastado pelo prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, mesmo que ainda não concluído o processo, pois esse prazo é peremptório.
 - (D)** Se a autoridade tiver ciência da irregularidade no serviço público, é recomendável que promova a apuração mediante processo administrativo disciplinar, portanto lhe é facultativo.
 - (E)** Para a aplicação de advertência por mais de 30 dias, e de suspensão de até 15 dias, basta a Sindicância.
- 15** Levando-se em conta os parâmetros normativos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal (Dec. 1.171, de 22 de junho de 1994), é(são) regra(s) de conduta profissional:
- (A)** Tratar rigorosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação de acordo com a impessoalidade comunicativa, com o objetivo de tornar as comunicações eletrônicas e, portanto, impessoais.
 - (B)** Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências da classe, mesmo que precise confrontar com a segurança coletiva.
 - (C)** Exercer, sem limites facultativos, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, atuando a favor dos legítimos interesses dos usuários dos serviços públicos.
 - (D)** Se for para observar as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa em lei, é facultado ao servidor exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público.
 - (E)** Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre o Código de Ética Profissional, estimulando seu integral cumprimento.



- 16** Quanto ao Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Decreto nº 5.825, de 12 de janeiro de 2005), é correto afirmar:
- (A) A alocação de cargos consiste no processo de distribuição destes baseado em critérios de dimensionamento objetivos, previamente definidos e expressos em uma matriz, visando ao desenvolvimento institucional.
 - (B) O ocupante da carreira é o servidor efetivo ou temporário que pertence ao quadro da IFE, ocupando o Plano de Carreira.
 - (C) O desempenho consiste na execução de atividades e na identificação da análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho.
 - (D) A capacitação é um processo permanente e deliberado de aprendizagem que depende da execução de atividades e cumprimento de metas.
 - (E) O desenvolvimento é um processo contínuo que amplia os conhecimentos do servidor e desenvolve atividades técnico-administrativas da gestão, dependente do vínculo entre os servidores e a IFE.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 17** Se todo X é Y e nenhum Y é Z, conclui-se que
- (A) nenhum Y é X.
 - (B) nenhum X é Z.
 - (C) todo X é Z.
 - (D) todo Z é Y.
 - (E) todo Y é X.
- 18** Três amigas, Ana, Laura e Maria, são casadas com Jonas, Roberto e Paulo, mas não se sabe quem é casada com quem. A profissão de cada marido é professor, médico e advogado, mas também não se sabe exatamente o que cada um faz. Com base nas quatro informações a seguir: a) O médico é casado com Maria, b) Paulo é advogado, c) Laura não é casada com Paulo e d) Roberto não é médico, é correto afirmar que
- (A) Laura é casada com Jonas.
 - (B) Jonas é professor.
 - (C) Paulo é casado com Ana.
 - (D) Roberto é advogado.
 - (E) Ana é casada com Roberto.
- 19** Todos os gatos são felinos. Assim sendo,
- (A) o conjunto dos gatos contém o conjunto dos felinos.
 - (B) o conjunto dos felinos contém o conjunto dos gatos.
 - (C) todos os felinos são gatos.
 - (D) algum gato não é felino.
 - (E) nenhum gato é felino.
- 20** O próximo termo da série ADE, BFH, CHK, ... é
- (A) DJN.
 - (B) DFH.
 - (C) CFG.
 - (D) FEI.
 - (E) BUI.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21** Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, o exame que **NÃO** faz parte daqueles que devem ser solicitados rotineiramente, de preferência na 1ª consulta do Pré-Natal, é o(a)
- (A) hemograma.
 - (B) urocultura.
 - (C) rotina de urina.
 - (D) sorologia para rubéola.
 - (E) glicemia.
- 22** Quanto aos aspectos nutricionais na gestação, está **INCORRETA** a alternativa
- (A) A obesidade na gravidez está associada a uma frequência mais alta de distócias e a um risco maior de cesariana.
 - (B) As gestantes deverão ter ganhos de peso distintos, de acordo com seu IMC inicial.
 - (C) A gestante com baixo peso corre um risco maior de fetos PIG e gravidez prolongada.
 - (D) Gestantes com IMC adequado devem ganhar, até o fim da gestação, entre 11,5 e 16,0kg.
 - (E) No primeiro trimestre, não há necessidade de aumento da ingesta calórica.
- 23** Na cardiocografia basal, as desacelerações variáveis significam
- (A) boa oxigenação fetal.
 - (B) hipoglicemia materna.
 - (C) compressão do polo cefálico fetal.
 - (D) compressão do cordão umbilical.
 - (E) cardiopatia fetal.
- 24** Entre as drogas utilizadas para tocólise, aquela que, cientificamente, pode beneficiar a gestante na inibição do trabalho de parto é a(o)
- (A) buscopolamina.
 - (B) dactil OB.
 - (C) betametasona.
 - (D) nifedipina.
 - (E) prostaglandina E2.
- 25** Na distócia de ombro, a primeira manobra a ser utilizada é
- (A) Zavanelli.
 - (B) Bracht.
 - (C) Mauriceau.
 - (D) McRoberts.
 - (E) Woods.
- 26** Durante o trabalho de parto, a insinuação do polo cefálico em OP e OS ocorre com frequência nas gestantes com bacia do tipo
- (A) platipeloide.
 - (B) ginecoide.
 - (C) androide.
 - (D) antropoide.
 - (E) viciada.



- 27** As drogas classificadas com fator de risco C pela FDA são aquelas nas quais
- (A) os estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto e não há pesquisas controladas em mulheres, por isso devem ser administradas somente se o benefício esperado justificar o potencial de risco para o feto.
 - (B) os estudos em animais e no homem demonstram anormalidades fetais, sendo contraindicada em mulheres que estão grávidas.
 - (C) há evidências de risco para o feto humano, mas os benefícios do uso na gestante podem justificar o risco, como no risco de vida iminente.
 - (D) as pesquisas em reprodução animal não demonstraram um risco fetal, mas não há estudos controlados em mulheres grávidas.
 - (E) os estudos em animais mostraram um efeito adverso, mas não foram confirmados em estudos controlados em mulheres grávidas no primeiro trimestre.
- 28** Gestante com IG de 16 semanas, calculada pela DUM, vem para primeira consulta de rotina pré-natal e o obstetra encontra altura uterina de 22 cm. Nesse caso, há suspeita de
- (A) insuficiência placentária.
 - (B) diabetes melito gestacional.
 - (C) oligoâmnio.
 - (D) infecção congênita.
 - (E) erro de DUM.
- 29** O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade de intercorrências e óbito materno e/ou fetal. O fator de risco que permite a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica é a(o)
- (A) gravidez gemelar.
 - (B) pré-termo em gestação anterior.
 - (C) óbito intrauterino de causa desconhecida em gravidez anterior.
 - (D) hemoglobina menor que 8g/dl.
 - (E) gestante com HAS controlada com antihipertensivo.
- 30** A Ultrassonografia com Dopplerfluxometria vem sendo utilizada para investigar, de maneira não invasiva, o acometimento do feto pela Doença Hemolítica Perinatal. Para isso, deve-se avaliar
- (A) a presença de incisura protodiastólica na artéria uterina.
 - (B) o formato da onda de velocidade de fluxo sanguíneo da aorta descendente fetal.
 - (C) o índice sístole/diástole na artéria umbilical.
 - (D) o pico da velocidade do fluxo sanguíneo da artéria cerebral média.
 - (E) o formato da onda da veia cava fetal.
- 31** Paciente de 26 anos de idade, portadora de Diabetes melitus tipo 1 diagnosticada aos 10 anos de idade, procura aconselhamento, pois deseja engravidar. Os exames laboratoriais que devem ser solicitados com o objetivo de minimizar a morbimortalidade materno-fetal são
- (A) ecocardiograma, curva de insulina e glicemia de jejum.
 - (B) urina rotina, glicemia de jejum e dosagem do peptídeo C.
 - (C) exame de fundo de olho, cálculo da glicemia média e curva de insulina.
 - (D) urina rotina, exame de fundo de olho e dosagem do peptídeo C.
 - (E) exame de fundo de olho, hemoglobina glicada e dosagem de creatinina.



- 32** Para escolher o melhor método de tratamento inicial de gestante com doença trofoblástica gestacional (DTG), o obstetra deve levar em consideração
- (A) o volume uterino.
 - (B) a idade gestacional.
 - (C) o tipo sanguíneo da gestante.
 - (D) o tipo de DTG.
 - (E) a presença de comorbidades associadas.
- 33** Sobre as gestações gemelares monocoriônicas e diamnióticas, são feitas as seguintes afirmativas.
- I – Têm sempre origem monozigótica.
 - II- Apresentam o sinal do lâmbda na ultrassonografia.
 - III- Apresentam risco de transfusão feto-fetal.
 - IV- São o tipo mais comum de gravidez gemelar.
- Estão corretas
- (A) apenas I e IV.
 - (B) apenas I e II.
 - (C) apenas I e III.
 - (D) apenas I, II e III.
 - (E) apenas II e IV.
- 34** Primigesta de 19 anos, 34 semanas de idade gestacional, dá entrada na maternidade queixando-se de cefaleia, alteração da visão e dor epigástrica. Ao exame físico: PA=170x110 mmHg, AU= 30 cm, BCF 136 bpm, ausência de dinâmica uterina, útero com tônus normal, colo grosso, posterior, fechado. A conduta é
- (A) indicar cesariana imediata, pois se trata de iminência de eclâmpsia.
 - (B) corticoide, hidralazina e indução do parto.
 - (C) nifedipina e cesariana após estabilização da PA.
 - (D) corticoide, hidralazina e cesariana após 24 horas.
 - (E) sulfato de magnésio e hidralazina.
- 35** Paciente em amenorreia de 7 semanas, com exame de beta HCG positivo, realizou ultrassonografia que mostrou massa tubária à esquerda e ausência de saco gestacional intrauterino. O tratamento com metotrexate está indicado se houver
- I – embrião vivo.
 - II- estabilidade hemodinâmica.
 - III- beta HCG maior que 10.000.
 - IV- massa anexial até 4 cm.
- Estão corretas
- (A) apenas I e IV.
 - (B) apenas I e II.
 - (C) apenas I e III.
 - (D) apenas I, II e III.
 - (E) apenas II e IV.



36 Multípara, 38 anos de idade, 2 partos normais e uma cesárea, com IG de 33 semanas, queixa de perda de sangue via vaginal há duas horas. Nega dor e relata dois episódios anteriores de sangramento em pequena quantidade. AU= 32 cm. Ausência de dinâmica uterina. Tônus uterino normal. BCF= 140 bpm. A hipótese diagnóstica e principal complicação associada são, respectivamente,

- (A) descolamento prematuro de placenta e atonia uterina.
- (B) rotura de *vasa praevia* e sofrimento fetal agudo.
- (C) placenta de inserção baixa e rotura uterina.
- (D) placenta de inserção baixa e acretismo placentário.
- (E) rotura de seio marginal e rotura prematura de membranas ovulares.

37 As hemorragias no período gravídico-puerperal são importantes causas de mortalidade materna. Quanto às patologias que causam hemorragias na segunda metade da gestação, analise as afirmativas seguintes.

I - A rotura de *vasa praevia* pode acontecer em placentas bilobadas.

II - O sinal de Clarck é característico de rotura uterina iminente.

III- O DPP pode ocorrer de forma assintomática.

IV- Na rotura de seio marginal, o sangramento é de origem fetal.

Estão corretas

- (A) apenas I e IV.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas II e IV.

38 Quanto às patologias que causam sangramento na primeira metade da gestação, analise as afirmativas a seguir.

I - O cariótipo mais frequente da mola completa é o 46 XX.

II - As gestantes com mola hidatiforme devem ter acompanhamento com dosagem de gonadotrofina coriônica (β HCG) mensal após o esvaziamento uterino.

III- A causa mais frequente de abortamento de repetição no primeiro trimestre é a incompetência istmocervical.

IV- O uso de contraceptivo de emergência com levonorgestrel é considerado fator de risco para prenhez ectópica.

Estão corretas

- (A) apenas I e IV.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas II e IV.



39 Quartigesta, tercípara, 34 anos de idade, 11 semanas de gestação pela DUM, ciclos regulares, procura pronto atendimento com queixa de sangramento vaginal, em moderada intensidade, de início súbito, náuseas e vômitos e cólicas discretas. Relata que ainda não iniciou o acompanhamento pré-natal. Ao exame físico: regular estado geral, hipocorada, hidratada, afebril, PA: 120x80 mmHg, FC=98 bpm, altura uterina: 14 cm, BCF inaudível, dinâmica uterina ausente, exame especular com sangramento pelo colo uterino, OE fechado. O diagnóstico provável e a conduta adequada são

- (A) óbito fetal e realizar esvaziamento uterino por microcesárea.
- (B) descolamento prematuro de placenta e realizar ultrassonografia.
- (C) doença trofoblástica gestacional e internar para exames e tratamento.
- (D) placenta prévia e realizar ultrassonografia para confirmar.
- (E) óbito fetal e realizar esvaziamento uterino por indução com misoprostol.

40 Quanto ao PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS do HIV do Ministério da Saúde (2019), analise as afirmativas a seguir.

I – No Brasil, está recomendada a TARV para todas as pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente do seu estágio clínico ou imunológico.

II – O esquema preferencial para gestantes em início de tratamento deve ser Tenofovir, Lamivudina e Raltegravir.

III – A TARV deve ser mantida após o parto, independentemente da contagem de LT-CD4+ e dos sinais e sintomas clínicos da mulher.

IV – É contraindicado o uso de Abacavir na gravidez.

Estão corretas

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas I, III e IV.

41 Mulher de 70 anos de idade, G4 P4, sem comorbidades, refere ter apresentado pequeno sangramento pela vagina, há uma semana. Ao exame físico, vagina, colo do útero e corpo uterino estão normais para a idade. O diagnóstico mais provável é de

- (A) hiperplasia endometrial típica.
- (B) hiperplasia endometrial com atipia.
- (C) atrofia endometrial.
- (D) carcinoma endometrial.
- (E) pólipos endometrial.



42 O período menstrual é evento importante na rotina das mulheres. O sangramento uterino anormal (SUA), por sua vez, pode alterar, de forma significativa, a percepção de saúde e a qualidade de vida femininas. A respeito das condições causais de SUA, analise as afirmativas a seguir.

I. O leiomioma e a adenomiose destacam-se entre as anomalias uterinas do tipo estrutural causadoras de SUA.

II. A disfunção ovulatória da adolescência é causa de SUA, tipicamente ocasionada pelo excesso de progesterona.

III. A coexistência de leiomioma e adenomiose é rara.

IV. O sinal de Dionisi pode ser encontrado na histerossalpingografia de paciente com adenomiose.

Estão corretas

- (A) apenas I e IV.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas II e IV.

43 O herpes genital é a IST ulcerativa mais frequente. Sobre a infecção pelo HSV, analise as afirmativas a seguir.

I – No caso de manifestações severas com lesões mais extensas, pensar na coexistência de infecção pelo HIV, quando se recomenda tratamento injetável com aciclovir, via venosa.

II – No 1º episódio de herpes genital, iniciar o tratamento o mais precocemente possível, com terapia sistêmica (oral) com aciclovir ou valaciclovir ou famciclovir, pode levar à cura definitiva.

III – Nas recidivas, o tratamento deve ser iniciado ao aparecimento dos primeiros pródromos (aumento de sensibilidade, ardor, dor, prurido) com terapia sistêmica (oral) com aciclovir ou valaciclovir ou famciclovir.

IV – O citodiagnóstico de Tzank é patognomônico de herpes genital.

Estão corretas

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas I, III e IV.

44 Adolescente de 17 anos de idade refere nunca ter menstruado. Exame físico: estadiamento puberal pelos critérios de Tanner: M(mamas) 1 e P(pelos) 1. Peso = 41 kg, Altura = 145 cm (<percentil 5). Apresenta níveis elevados de FSH (hormônio folículo-estimulante). Com base nessas informações, o diagnóstico mais provável é

- (A) amenorreia hipotalâmica.
- (B) disgenesia gonadal.
- (C) síndrome de insensibilidade androgênica.
- (D) agenesia dos ductos de Müller.
- (E) deficiência de 5-alfa redutase.



- 45** Sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, analise as afirmativas a seguir.
- I- As glândulas situadas de cada lado do orifício vaginal, em contato com a extremidade posterior e lateral do bulbo do vestíbulo são as glândulas vestibulares maiores ou glândulas de Bartholin.
 - II- A região anterior da vulva recebe inervação sensitiva do nervo ilioinguinal e do nervo genitofemoral.
 - III- A veia ovariana esquerda drena na veia renal de mesmo lado.
 - IV- Percorrendo o ligamento próprio do ovário, as artérias ovarianas irrigam esse órgão.
- Estão corretas
- (A) apenas I e II.
 - (B) apenas II e IV.
 - (C) apenas I e III.
 - (D) apenas I, II e III.
 - (E) apenas I, III e IV.
- 46** Paciente de 21 anos de idade procurou unidade de saúde queixando-se de corrimento vaginal. Relatou início de relacionamento sexual há 30 dias, sem uso de condom. Apresentou, ao exame especular, colo com orifício externo friável, eliminando secreção mucopurulenta. Devido à dificuldade de realização de procedimentos diagnósticos complementares e considerando os critérios do Ministério da Saúde, o médico deve
- (A) encaminhar para unidade de saúde de referência.
 - (B) tratar como Tricomoniase e receitar metronidazol oral.
 - (C) encaminhar para colposcopia.
 - (D) tratar como cervicite e receitar ceftriaxona e azitromicina.
 - (E) tratar como DIP e receitar ciprofloxacina.
- 47** Paciente de 45 anos procurou o ginecologista queixando-se de derrame papilar sanguinolento espontâneo na mama esquerda há 30 dias. Trouxe mamografia, realizada há 2 meses, revelando mamas densas, com BIRADS 2. A principal hipótese diagnóstica é
- (A) alteração fibrocística benigna da mama.
 - (B) fibroadenoma hipercelular.
 - (C) ectasia ductal.
 - (D) papiloma intraductal.
 - (E) doença de Paget.
- 48** A respeito de dismenorreia funcional, é correto afirmar que
- (A) não costuma ter alívio com analgésico comum.
 - (B) pode iniciar pouco antes do fluxo menstrual, com alívio em, no máximo, 2 dias.
 - (C) pode não estar associada somente ao período menstrual, durando todo o ciclo menstrual.
 - (D) o uso de inibidores da prostaglandina como tratamento não costuma ter efeito.
 - (E) o uso de contraceptivos hormonais combinados está contraindicado como tratamento em adolescentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 10, DE 10 DE JANEIRO DE 2022
MÉDICO / ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA



- 49** Para mulheres no climatério se queixando de ciclos menstruais longos, sem sintomas vasomotores, a prescrição mais adequada é
- (A)** progestagênios por 10 a 14 dias, simulando a segunda fase do ciclo.
 - (B)** estrogênios isolados de forma contínua.
 - (C)** associação estrogênios-progestagênios, com estrogênios do 5º ao 25º dia do ciclo e progestagênios do 13º ao 25º dia do ciclo.
 - (D)** associação estrogênios-progestagênios de forma contínua.
 - (E)** progestagênios isolados de forma contínua.
- 50** Segundo as orientações da FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), quanto à assistência à anticoncepção, analise as assertivas a seguir.
- I - O rastreamento universal de trombofilia antes da prescrição de contraceptivo hormonal combinado não é recomendado.
 - II- Os dispositivos intrauterinos são eficazes e seguros para nulíparas, recomendando-se que devam ser incluídos nas opções contraceptivas oferecidas rotineiramente.
 - III- A prescrição de métodos anticoncepcionais para adolescente menor de 14 anos, desde que respeitados os critérios médicos de elegibilidade, não constitui ato ilícito por parte do médico.
 - IV- O uso dos métodos intrauterinos (DIU e SIU) é contraindicado em adolescentes, pois seus riscos superam os eventuais benefícios.
- Estão corretas
- (A)** apenas I e II.
 - (B)** apenas II e IV.
 - (C)** apenas I e III.
 - (D)** apenas I, II e III.
 - (E)** apenas I, III e IV.