



**PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2020 – PSRMPS 2020
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019**

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
ENFERMAGEM**

Questão 24

A referência bibliográfica: INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Parâmetros técnicos para o rastreamento do câncer do colo do útero. - Rio de Janeiro: Inca, 2019, que consta no Anexo III, publicado no dia 10/10/2019 às 17:40 na página do ceps.ufpa.br, solicitada na questão 24 da prova de Enfermagem Obstétrica do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional 2020, afirma em sua página 15 “mulheres com LSIL ou ASC-US no resultado do exame de rastreamento devem repetir o exame citopatológico após seis meses ou um ano, de acordo com a faixa etária: em um ano para mulheres de até 30 anos e em seis meses para aquelas com mais de 30 anos”, ou seja, exatamente como descrita na questão, tornando-a totalmente correta.

Portanto, matem-se a alternativa (A) como correta.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 30

A alternativa (C) está totalmente incorreta, visto que, conforme referência citada (ZUGAIB, 2012), mais especificamente no capítulo que trata da “Doença hipertensiva específica da gestação”, afirma que:

A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) compreende o conjunto das alterações pressóricas observadas na gestação, incluindo pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, caracterizada pela presença de hipertensão arterial, edema e proteinúria a partir de 20 semanas de gestação, em pacientes previamente normotensas. Considera-se proteinúria patológica a presença de 300 mg ou mais de proteínas excretas na urina coletada em 24 horas. Esta patologia pode ser classificada como pré-eclâmpsia leve ou grave. Na pré-eclâmpsia leve considera-se proteinúria maior ou igual a 300 mg em 24 horas e na pré-eclâmpsia grave considera-se proteinúria maior ou igual a 5 g ou 5000 mg em 24 horas. Além disso, o comendo da questão solicita a alternativa correta, com base nessa referência, sobre este quadro patológico na gravidez. Portanto, o valor da proteinúria acima de 200 mg ainda não pode ser considerado proteinúria significativa nem caso de pré-eclâmpsia leve, como afirmado no recurso do candidato.

Portanto, matem-se a alternativa (C) como incorreta e a alternativa correta a letra (D).

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 42

No que se refere ao motivo do recurso do candidato sobre a questão da prova de Enfermagem Obstétrica vamos considerar o **deferimento**. Ocorre que a questão está toda completa, porém dentre os problemas permanentes do cenário epidemiológico faltou **acrescer a mortalidade materna**, ainda que todos os outros problemas estejam contidos na questão.

- RECURSO PROCEDENTE

- QUESTÃO ANULADA