



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2024
EDITAL Nº 1 - COREMU/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2023

BOLETIM DE QUESTÕES

Nome: _____ Nº de Inscrição: _____

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (PRMS) – ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO: ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO/HUJBB/BELÉM/PA /
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (PRMS) – ÁREA
DE CONCENTRAÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO SISTEMA PÚBLICO DE
SAÚDE/HUJBB/ICS/UFPA/UBS/BELÉM/PA /
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (PRMS) – ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO: PATOLOGIA BUCAL/HUJBB/ICS/BELÉM/PA**

ODONTOLOGIA

19 de novembro de 2023

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde à especialidade na qual você se inscreveu, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão-resposta. Caso contrário comunique ao fiscal de sala.
- 2 Esse Boletim de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 15 (quinze) questões de SUS e 35 (trinta e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) alternativas, identificadas por (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta.
- 3 Confira se, além deste Boletim de Questões, você recebeu o Cartão-Resposta destinado à marcação das respostas das questões objetivas, que será o único documento considerado para a correção. O Boletim de Questões deve ser usado apenas como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito de correção.
- 4 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se seu nome e o número de sua inscrição conferem com os dados contidos no Cartão-Resposta. Em caso de divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala. O Cartão-Resposta só será substituído se nele for constatado erro de impressão.
- 5 Será de exclusiva responsabilidade do candidato a certificação de que o Cartão-Resposta que lhe for entregue no dia da prova é realmente o seu. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do Cartão-Resposta.
- 6 A marcação do Cartão-Resposta deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com marcação a lápis ou com marcação com caneta de cor não especificada no edital, com mais de uma alternativa marcada e aquelas que contiverem qualquer espécie de corretivo sobre as alternativas.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, com início às 14h30 e término às 18h30, observado o horário de Belém/PA. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas após o início da prova.
- 8 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o Boletim de Questões e o Cartão-Resposta, e assinar a Lista de Presença.
- 9 O candidato poderá levar o Boletim de Questões restando 60 minutos para o término da prova.

Boa Prova!



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50.

SUS

- 1 A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde, delibera que gestão das ações e dos serviços de saúde devem ser solidárias e participativas entre os três entes da Federação: a União, os estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. A estrutura do Sistema Único de Saúde é fundamental para o cumprimento dos princípios de universalidade, equidade e integralidade. Analise as afirmações a seguir.
- I. Para a Secretaria de Saúde de Belém implementar qualquer política municipal de saúde é necessária a aprovação e deliberação no Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço e usuários e que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído de Belém.
- II. No Município de Cametá, que não dispõe de uma rede de atenção que atenda às necessidades da sua população e necessita de articulação e pactuação com outros municípios e com o Estado para garantia da integralidade do cuidado, essas negociações se dão na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é o foro de negociação e pactuação entre gestores estadual e municipais quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.
- III. O Ministério da Saúde é o gestor nacional do Sistema Único de Saúde, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Atua no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para pactuar o Plano Nacional de Saúde. Integram sua estrutura Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais.
- Está correto o que se afirma em
- (A) I, II e III.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, apenas.



- 2 Ao longo do tempo, a Lei n. 8.080/1990 foi alterada pelas Leis n. 9.836, de 23 de setembro de 1995; n. 10.424, de 15 de abril de 2006; n. 11.108, de 7 de abril de 2007; n. 12.401, de 12 de abril de 2011; n. 12.466, de 24 de agosto de 2011; n. 12.895, de 18 de dezembro de 2013; e pela LC n. 141, de 13 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2015). Os instrumentos para o planejamento e a gestão no âmbito do SUS são o Plano de Saúde e as respectivas programações anuais e o relatório de gestão. Esses instrumentos interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. Analise as afirmações a seguir.
- I. Belém necessita de um Plano de Saúde Municipal para nortear a elaboração do orçamento do governo no tocante aos investimentos com a saúde. Pois este é instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde da gestão municipal do Sistema Único de Saúde para o período de seis anos.
- II. A Elaboração do Plano de Saúde de Abaetetuba e dos demais municípios do Pará deve ser orientado pelas necessidades de saúde da população, considerando a análise situacional, orientada pelos temas contidos no Mapa da Saúde: estrutura do sistema de saúde; Redes de Atenção à Saúde; condições socio sanitárias; fluxos de acesso; recursos financeiros; gestão do trabalho e da educação na saúde; ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde; e gestão; definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; processo de monitoramento e avaliação.
- III. O Plano Estadual de Saúde do Pará deverá, além de todos os aspectos presentes nos planos municipais, explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos municípios, pactuada pelos gestores estaduais e municipais na CIB antes de serem aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde.

Está **INCORRETO** o que se afirma em

- (A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.
- 3 AMB, idoso, 67 anos, convive com o diabetes mellitus há 10 anos, com amputação de membro inferior direito por sequelas da doença. Chega na Unidade aborrecido com o atendimento anterior, referindo não ter sido bem acolhido. Desde sua nomeação para gestão da Unidade Básica de Saúde do Guamá, há um mês, você vem percebendo muitas queixas dos usuários sobre o acolhimento e a falta de informação. Tendo em vista a implementação da política de humanização e a maior satisfação dos usuários, julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das diretrizes a seguir.
- () Comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de co-responsabilidade, e com a rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na atenção em saúde.
() Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e acesso aos demais níveis do sistema.
() Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde.
() Incentivar práticas promocionais de saúde
- A sequência correta é
- (A) V, V, V e F.
(B) V, V, F e V.
(C) F, V, V e V.
(D) V, F, V e V.
(E) V, V, V e V.



- 4 Sobre o Sistema Único de Saúde é **INCORRETO** afirmar o seguinte:
- (A) A política de saúde vigente antes da criação do Sistema Único de Saúde atendia a interesses não coincidentes com os dos usuários dos serviços. O modelo assistencial se configurava como excludente, discriminatório e centralizador.
 - (B) O marco histórico para o surgimento do Sistema Único de Saúde foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, no período da Nova República.
 - (C) Em outubro 1986, foi promulgada a Constituição Federal, que aprovava a criação do Sistema Único de Saúde brasileiro.
 - (D) Na Constituição, o direito da saúde a todos os cidadãos vem expresso no Art. 196 que diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”.
 - (E) A Lei Federal 8080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- 5 Sobre a rede de atenção à saúde julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações a seguir.
- A rede de atenção à saúde consiste em arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
 - Um dos objetivos da rede de atenção à saúde é incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica.
 - A rede de atenção à saúde caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção e o centro de comunicação na atenção primária à saúde (APS).
 - São alguns dos atributos da rede de atenção à saúde população e território definidos, prestação de serviços especializados em lugar adequado, participação social ampla, sistema de informação integrado e gestão baseada em resultados.
- A sequência correta é
- (A) V, V, V, F.
 - (B) V, V, F, V.
 - (C) V, F, V, V.
 - (D) F, V, V, F.
 - (E) V, V, V, V.
- 6 J.M.C, 13 anos, chega na Unidade de Saúde da Família da Ilhada Combú acompanhada da genitora, com amenorreia há cinco semanas, refere menarca aos 11 anos com fluxo e frequência regular. Evolui com enjoos e resultado positivo para gravidez. Compreendendo a situação estabelecida de gravidez de risco e o seu conhecimento sobre Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações a seguir, sobre o embasamento para sua conduta no encaminhamento ao ponto de atenção de média e alta complexidade (atenção secundária e terciária).
- Na Rede de Atenção à Saúde (RAS) o centro de comunicação, a unidade ordenadora e coordenadora do cuidado é a Atenção Primária à Saúde (APS).
 - A estrutura operacional das RAS determina que os pontos de atenção (secundária e terciária) são componentes para uma atenção integral.
 - A região de saúde deve ser bem definida, baseada em parâmetros espaciais e temporais que permitam assegurar que as estruturas estejam bem distribuídas territorialmente, garantindo o tempo/resposta necessário ao atendimento, melhor proporção de estrutura/população/território e viabilidade operacional sustentável.
- A sequência correta é
- (A) V – V – V.
 - (B) V – V – F.
 - (C) V – F – V.
 - (D) F – V – V.
 - (E) F – F – V.



- 7 O princípio de descentralização passa a ser associado à regionalização da assistência, que requer a articulação dos gestores municipais para a negociação e a pactuação de referências intermunicipais, sob coordenação e regulação estadual, por meio da programação pactuada e integrada. Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações a seguir.
- (___) A regionalização deve ser entendida como uma articulação e mobilização municipal que leve em consideração características geográficas, fluxo de demanda, perfil epidemiológico, oferta de serviços.
- (___) Cabe às secretarias de estado da saúde e do Distrito Federal a elaboração do plano diretor de regionalização, em consonância com o Plano Estadual de Saúde, sua submissão à aprovação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB – e do Conselho Estadual de Saúde – CES – e o encaminhamento ao Ministério da Saúde.
- (___) O processo de regionalização deve ser estabelecido como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- A sequência correta é
- (A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) V – F – F.
(E) V – V – V.
- 8 J.A.P. é moradora do Maçaranduba, comunidade quilombola do Alto Acará. Buscou compreender o processo que garante a adequada prestação de serviços à sua comunidade, por meio de ações diretas e finais de atenção à saúde. Neste processo, J.A.P. identificou que estas informações são sustentadas pela Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde. Além disso, observou que, embora integradas, a regulação que tem como objeto a necessidade de JAP é de
- (A) sistemas de saúde.
(B) atenção à saúde.
(C) acesso à assistência.
(D) sistemas de assistência.
(E) acesso à clínica.
- 9 J.A.P. verificou que a regulação assistencial que tem como objeto o processo de organização, controle, gerenciamento e priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, possui a seguinte ação, que pode ser aplicada a sua comunidade:
- (A) elaboração de decretos, normas e portarias que dizem respeito às funções de gestão.
(B) planejamento, financiamento e fiscalização de sistemas de saúde.
(C) auditoria assistencial ou clínica.
(D) programação pactuada e integrada – PPI.
(E) regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências.



10 M.A., 40 anos, mulher trans, residente no setor do Distrito D'água, em Belém do Pará, procurou a principal porta de entrada para ações de saúde individuais, familiares e coletivas para práticas de cuidado integrado com equipe multiprofissional. O acompanhamento do cuidado em saúde de M.A. é garantido pelos seguintes princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde operacionalizados na Atenção Básica:

- (A) universalidade, regionalização e hierarquização.
- (B) equidade, regionalização e hierarquização.
- (C) integralidade, resolutividade, cuidado centrado na pessoa.
- (D) universalidade, equidade, integralidade.
- (E) territorialização, universalidade e resolutividade.

11 J.A.R., ribeirinho do Distrito de Mosqueiro, é usuário de uma unidade de saúde que possui as seguintes recomendações para uso no âmbito da atenção básica:

“a. consultório médico; consultório de enfermagem; área para assistência farmacêutica; laboratório; sala de vacina; sala de procedimentos; e, se forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório odontológico com equipo odontológico completo;

b. área de recepção; banheiro público; banheiro exclusivo para os funcionários; expurgo; cabines com leitos em número suficiente para toda a equipe; cozinha e outros ambientes, conforme necessidade.”

J.A.R. frequenta a

- (A) Unidade Básica de Saúde.
- (B) Unidade Odontológica Móvel.
- (C) Unidade Básica de Saúde Fluvial.
- (D) Unidade Odontológica de Saúde Fluvial.
- (E) Unidade Básica de Saúde Bucal.

12 F.F.N. atua como gestor público da área da saúde no Estado do Pará e discorreu sobre os objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, visando a mitigar a ocorrência de evento adverso na atenção à saúde. O objetivo apontado por F.F.N. foi

- (A) promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente na atenção básica, levando em consideração que os demais níveis de atenção possuem riscos assegurados por lei.
- (B) envolver os pacientes nas ações de segurança, levando em consideração que os familiares não possuem direito a saber sobre os acontecimentos em saúde dos pacientes.
- (C) gerenciar as informações relativas à segurança do paciente, visando a gerar pânico sobre o assunto na população.
- (D) produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.
- (E) fomentar a inclusão do tema segurança do paciente nos ensinamentos básico e fundamental.



- 13 A.L.T., 44 anos, paraense, é o representante da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP). Ao Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP) compete
- (A) incentivar e difundir métodos operacionais que visem à melhor gerência dos serviços de saúde.
 - (B) propor e validar projetos de capacitação em prevenção, aplicada à atenção primária.
 - (C) recomendar estudos e pesquisas relacionados à prevenção, aplicada à atenção primária.
 - (D) elaborar seu regimento interno e submetê-lo à aprovação das prefeituras, para a instalação municipal.
 - (E) propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas.
- 14 A incorporação, exclusão ou alteração pelo Sistema Único de Saúde de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica é estabelecida pela(o)
- (A) Programa Nacional de Segurança do Paciente.
 - (B) Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
 - (C) Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
 - (E) Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização.
- 15 Em relação ao protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde é correto afirmar que
- (A) a Atenção Primária em Saúde / Estratégia Saúde da Família oferece atendimento resolutivo, além de manter a longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, com grande potencial de identificação precoce de casos graves, que devem ser manejados em serviços especializados.
 - (B) as unidades hospitalares oferecem atendimentos resolutivos, além de manter a longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, com grande potencial de identificação precoce de casos graves, que devem ser manejados em serviços especializados.
 - (C) os casos leves de síndrome gripal e de COVID-19 devem ser estabilizados e encaminhados a serviços de urgência/emergência ou hospitalares.
 - (D) os casos graves de síndrome gripal e de COVID-19 devem ser submetidos ao manejo terapêutico e a isolamento domiciliar.
 - (E) dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre adultos jovens (pessoas com 18 a 35 anos), deve-se priorizá-los para atendimento.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 16 Em 1942, Stafne descreveu uma série de lesões radiolúcidas assintomáticas, localizadas próximo ao ângulo da mandíbula. Sobre o cisto ósseo de Stafne, leia as afirmativas.
- A maioria dos casos representa um cisto revestido por epitélio pavimentoso estratificado.
 - A maioria dos casos representa uma concavidade focal do osso cortical na superfície lingual da mandíbula.
 - A maioria dos cistos é unilateral, embora também haja casos bilaterais descritos.
 - Na maioria dos casos, a lesão é congênita.
- Marque a alternativa que destaca as afirmativas corretas.
- I e IV, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I e III, apenas.
 - II e IV, apenas.
 - I e II, apenas.
- 17 Muitos cistos de desenvolvimento da região de cabeça e pescoço tiveram sua origem associada ao epitélio aprisionado ao longo das linhas de fusão dos processos embrionários. Entretanto, o conceito de uma origem fissural, para muitos desses cistos, tem sido questionado nos últimos anos. Assinale a alternativa que apresenta o cisto de desenvolvimento mais comumente encontrado na cavidade oral.
- Cisto do ducto nasopalatino.
 - Cisto nasolabial.
 - Cistos palatinos do recém-nascido.
 - Cisto dentífero.
 - Queratocisto.
- 18 A sífilis é uma infecção crônica mundial causada pelo *Treponema pallidum*. Os humanos são os únicos hospedeiros naturais comprovados para a sífilis. Em relação à Sífilis, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as sentenças e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.
- Condiloma lata é uma manifestação clínica da sífilis secundária.
- Cancro é uma manifestação clínica da sífilis terciária.
- Incisivos de Hutchinson é uma manifestação da sífilis terciária.
- O teste de absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes (FTA-ABS) é um teste sorológico específico e altamente sensível para o diagnóstico da sífilis.
- A sequência correta é
- F – F – V – V.
 - F – V – F – V.
 - V – F – F – V.
 - V – V – V – F.
 - F – V – V – V.



19 A candidíase é a infecção fúngica oral mais comum nos seres humanos e tem uma série de manifestações clínicas, às vezes, dificultando o diagnóstico. Sobre a candidíase oral, leia as frases.

- I. A candidíase pseudomembranosa é caracterizada pela presença de graus variados de eritema.
 - II. A glossite rombóide mediana é uma manifestação clínica da candidíase eritematosa.
 - III. A candidíase hiperplásica crônica caracteriza-se por uma mancha branca facilmente removida por raspagem.
 - IV. A citologia esfoliativa, associada aos sinais clínicos, é um método efetivo para o diagnóstico.
- Marque a alternativa que destaca as afirmativas corretas.

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I e II, apenas.

20 O termo herpes deriva de uma palavra grega antiga que significa arrastar ou rastejar, o que faz aparentemente uma alusão à tendência à infecção recorrente. Em relação à infecção herpética, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A maioria dos casos de gengivostomatite herpética aguda oral (herpes primário) ocorre em adolescentes e adultos jovens.
- Na apresentação clínica da herpes primária, as lesões podem afetar tanto a mucosa oral móvel quanto a aderida.
- A localização mais comum da infecção recorrente pelo herpes simples é a mucosa do palato.
- Panarício herpético é o termo utilizado para infecção que acomete os dedos.

A sequência correta é

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – F – V – F.

21 Paciente do sexo feminino de 45 anos de idade, sem história de tabagismo, apresentou-se a uma Unidade Básica de Saúde do Sistema Único de Saúde com lesões queratóticas, exibindo projeções rugosas na superfície, localizadas na gengiva vestibular dos dentes canino, primeiro e segundo pré-molares inferiores do lado direito. Há lesão também na mucosa jugal do mesmo lado, porém, sem apresentar superfície verrucosa. A paciente foi submetida a uma biópsia incisional. O laudo histopatológico registrou um diagnóstico de hiperqueratose e acantose com displasia leve. Após análise dos dados clínicos e histológicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A lesão pode ser caracterizada como de baixo risco de transformação maligna, devido ao grau de displasia ser leve.
- (B) Os aspectos clínicos não podem prever as chances de recidiva.
- (C) A lesão pode ser caracterizada como de baixo risco de transformação maligna, pelo fato da paciente não ser tabagista.
- (D) As características clínicas da lesão sugerem baixo risco de recidiva, após excisão.
- (E) As características clínicas caracterizam a lesão como de alto grau de transformação maligna.



22 Os subsítios para o carcinoma orofaríngeo incluem o palato mole, base de língua, região tonsilar e parede posterior da faringe. Entre estes sublocais, a região _____ é acometida em cerca de 70 a 80% dos casos e a região _____ é o local preferido para os carcinomas associados ao papilomavírus humano (HPV). Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

- (A) do palato mole; posterior da faringe.
- (B) de base de língua; amigdalina.
- (C) de base de língua; posterior da faringe.
- (D) das amígdalas; amigdaliana.
- (E) do palato mole; amigdaliana.

23 As neoplasias de glândula salivar constituem uma importante área no campo da patologia oral e maxilofacial. Apesar de serem tumores incomuns, não são raros. Sobre as neoplasias que acometem primariamente as glândulas salivares, analisem-se as seguintes afirmações.

- I. O tumor que mais acomete a glândula parótida é o adenoma pleomórfico.
- II. O tumor que mais frequentemente é diagnosticado na glândula submandibular é o adenoma pleomórfico.
- III. O tumor que mais acomete a glândula sublingual é o adenoma pleomórfico.
- IV. O carcinoma adenóide cístico é a neoplasia maligna mais diagnosticada nas glândulas salivares menores da boca.

Marque a alternativa que destaca as afirmativas corretas.

- (A) I e IV, somente.
- (B) II e III, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) I e III, somente.

24 A síndrome de Sjogren é uma doença autoimune crônica sistêmica que envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia e xeroftalmia. Sobre a síndrome de Sjogren, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.

- A síndrome de Sjogren primária caracteriza-se pelo aparecimento primário da síndrome *sicca* e posteriormente de outra doença autoimune com manifestação sistêmica.
- A síndrome de Sjogren acomete preferencialmente homens de meia idade.
- A doença autoimune mais associada à síndrome é a artrite reumatóide.
- Pacientes com a síndrome possuem um risco aumentado de desenvolver linfomas de baixo grau.

A sequência correta é

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – F – V – F.



- 25 Paciente de 78 anos de idade do sexo feminino apresentou-se ao serviço de saúde do Sistema Único de Saúde com múltiplas pregas de tecido hiperplásico na região ântero-superior do vestíbulo alveolar associadas a uma prótese total. Baseado nas informações clínicas descritas, assinale a alternativa que apresenta o mais provável diagnóstico.
- (A) Fibroma.
(B) Granuloma piogênico.
(C) Fibroma ossificante periférico.
(D) Fibroma de células gigantes.
(E) Hiperplasia fibrosa inflamatória.
- 26 O granuloma piogênico é um crescimento nodular da cavidade oral que, tradicionalmente, tem sido considerado como tendo natureza não neoplásica. Sobre os granulomas piogênicos orais, assinale a alternativa correta.
- (A) Sua etiologia está associada a microrganismos piogênicos.
(B) A congestão vascular é responsável pela sintomatologia dolorosa.
(C) Possui predileção por homens de meia idade.
(D) A maioria dos casos é sintomática.
(E) Tem predileção pela gengiva.
- 27 Nos últimos anos, grande avanço tem sido feito na caracterização das lesões vasculares, neoplásicas ou não. Sobre os hemangiomas e as malformações vasculares, analisem-se as afirmações a seguir.
- I. Malformações vasculares são sempre congênitas.
II. Malformações vasculares sofrem involução.
III. Malformações vasculares intraósseas, nos ossos gnáticos, são detectadas em pacientes idosos.
IV. A maioria dos hemangiomas da infância sofre involução.
- Marque a alternativa que destaca as afirmativas corretas.
- (A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) I e III, apenas.
- 28 Há muito se debate se a lesão central de células gigantes é uma lesão reacional ou uma neoplasia benigna. Sobre a lesão central de células gigantes, assinale alternativa correta.
- (A) Existe uma clara predileção pela região posterior da maxila.
(B) A maioria dos casos atinge pacientes idosos do gênero masculino.
(C) Já está bem estabelecido na literatura que o aspecto histológico pode prever a agressividade da lesão.
(D) A maioria das lesões acontece em pacientes idosos.
(E) A lesão possui aspecto histológico indistinguível do tumor marrom do hiperparatireoidismo.



- 29 As lesões fibro-ósseas são um grupo diverso de doenças caracterizadas pela substituição do osso normal por tecido fibroso contendo material mineralizado neoformado. Sobre as lesões fibro-ósseas dos ossos gnáticos, analisem-se as seguintes afirmativas.
- I. A displasia fibrosa polioestótica associada à pigmentação café com leite e múltiplas endocrinopatias caracterizam a síndrome de Jaffe-Linchtenstein.
 - II. A maioria dos casos de displasia fibrosa é polioestótica.
 - III. A displasia óssea periapical exibe uma predileção marcante por mulheres negras.
 - IV. A displasia óssea florida exibe uma predileção marcante por mulheres negras.
- Marque a alternativa que destaca as afirmativas corretas.
- (A) I e IV, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) III e IV, apenas.
 - (E) I e III, apenas.
- 30 O cisto dentígero é definido como um cisto que tem origem pela separação do folículo que circunda a coroa de um dente não erupcionado. Sobre o cisto dentígero, assinale a alternativa correta.
- (A) Radiograficamente, pode apresentar-se como uma imagem radiolúcida uni ou multilocular associada à coroa de um dente incluso.
 - (B) O revestimento epitelial do cisto dentígero pode sofrer transformação para um ameloblastoma.
 - (C) O cisto dentígero ocorre com igual frequência em associação com os terceiros molares inferiores e superiores.
 - (D) Para que a lesão seja considerada um cisto dentígero, considera-se que o espaço radiolúcido que circunda a coroa de um dente deve ter, no mínimo, 10 mm de diâmetro.
 - (E) Possui alta recidiva após enucleação.
- 31 O queratocisto se origina de restos celulares da lâmina dentária. Tal lesão apresenta características histológicas específicas e comportamento clínico com alta taxa de recidiva, após curetagem ou enucleação. Sobre o queratocisto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.
- Possui predileção pela região posterior da mandíbula de pacientes entre 10 e 40 anos de idade.
 - Possui associação com a síndrome de Gardner.
 - Ceratocistos na região anterior da maxila que mimetizam cisto do ducto nasopalatino ocorrem, na maioria das vezes, em pacientes na primeira década de vida.
 - Os achados radiográficos podem simular um cisto dentígero.
- A sequência correta é
- (A) F – F – V – V.
 - (B) F – V – F – V.
 - (C) V – F – F – V.
 - (D) V – V – V – F.
 - (E) V – F – V – F.



- 32 O ameloblastoma é o tumor odontogênico de maior significado clínico. Sua frequência relativa se iguala à frequência combinada de todos os outros tumores odontogênicos, excluindo os odontomas. Sobre o ameloblastoma, assinale a alternativa correta.
- (A) Dor é um achado comum em ameloblastomas multicísticos de grandes proporções.
 - (B) Os subtipos histológicos do ameloblastoma convencional apresentam significativa relação com o comportamento do tumor.
 - (C) Há consenso na literatura que os subtipos histológicos do ameloblastoma unicístico não apresentam relação com o comportamento da neoplasia.
 - (D) Ameloblastomas periféricos geralmente acometem a mucosa jugal.
 - (E) O ameloblastoma intra-ósseo sólido convencional ou multicístico é raro em crianças abaixo de 10 anos e relativamente incomum no grupo de 10 a 19 anos de idade.
- 33 Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos. Sua prevalência excede a de todos os outros tumores odontogênicos combinados. Os odontomas são considerados como hamartomas. Sobre os odontomas, analisem-se as afirmativas abaixo.
- I. O odontoma composto é mais usualmente observado na região anterior da maxila.
 - II. O odontoma complexo ocorre mais na região dos molares de ambos os ossos gnáticos.
 - III. Os odontomas complexos apresentam maior índice de recidiva, quando realizada a curetagem como forma de tratamento, quando comparados aos odontomas compostos.
 - IV. O odontoma complexo tende a ser diagnosticado em pacientes mais jovens, quando comparados aos odontomas compostos.
- Estão corretas
- (A) I e IV, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) III e IV, apenas.
 - (E) I e III, apenas.
- 34 Os aspectos radiográficos, associados às características clínicas, são de valor inestimável ao diagnóstico presuntivo das lesões odontogênicas. Assinale alternativa que contém a lesão odontogênica que pode apresentar uma imagem mista (radiolúcida e radiopaca) em uma radiografia panorâmica.
- (A) Mixoma.
 - (B) Queratocisto.
 - (C) Fibroma ameloblástico.
 - (D) Cisto odontogênico glandular.
 - (E) Ameloblastoma.



- 35 Neoplasias odontogênicas podem produzir aspectos radiográficos diversificados, na dependência de produzirem material dentário ou substâncias que possam sofrer calcificação. Assinale a alternativa que contém o tumor odontogênico que pode apresentar, na radiografia, uma imagem radiolúcida contendo trabéculas delgadas insignificantes de osso residual, que frequentemente se arranjam em ângulos retos umas com as outras.
- (A) Tumor odontogênico de células granulares.
 - (B) Ameloblastoma.
 - (C) Queratocisto.
 - (D) Mixoma.
 - (E) Fibroma odontogênico.
- 36 Durante a permanência em Unidade de Terapia Intensiva é comum a ocorrência de infecções no sistema estomatognático, que se originam como consequência de manifestações sistêmicas, alterações relacionadas com o uso de medicamentos e com o estado geral de saúde do paciente. Assinale a alternativa que contém o recurso laboratorial que é útil no diagnóstico do herpes labial.
- (A) Método citológico de Tzanck.
 - (B) Método de coloração com ácido periódico de Schiff.
 - (C) Ágar cromogênico.
 - (D) Velocidade de hemossedimentação.
 - (E) Aplicação do vermelho congo na lesão.
- 37 O sistema hemostático mantém o sangue em estado fluido em condições fisiológicas, porém reage à lesão vascular corrigindo o defeito na parede vascular, para impedir que haja perda de sangue. Assinale alternativa correta em relação à ação da plaqueta na hemostasia.
- (A) O processo de agregação das plaquetas corresponde à ligação das plaquetas à substância do subendotélio.
 - (B) O processo de adesão plaquetária corresponde à ligação de uma plaqueta à outra plaqueta.
 - (C) As plaquetas participam exclusivamente do processo de hemostasia secundária.
 - (D) As plaquetas se ligam ao colágeno subendotelial através da glicoproteína IIb-IIIa.
 - (E) A vida média de uma plaqueta é de 7 a 10 dias.
- 38 A cascata de coagulação consiste em duas vias de ativação, intrínseca e extrínseca, que convergem para a via final comum com a ativação do fator X. Laboratorialmente, a via intrínseca é avaliada por meio _____ e a via extrínseca, pelo _____.
- Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
- (A) tempo de protrombina; tempo de tromboplastina parcial ativada.
 - (B) tempo de trombina; tempo de fibrinogênio.
 - (C) tempo de tromboplastina parcial ativa, tempo de trombina.
 - (D) tempo de tromboplastina parcial ativa; tempo de protrombina.
 - (E) tempo de trombina; tempo de fibrina.



- 39 As coagulopatias congênitas resultam de alterações quantitativas e/ou qualitativas dos fatores da coagulação. A hemofilia A decorre de anormalidades quantitativas ou funcionais do fator _____. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
- (A) IX.
 - (B) V.
 - (C) VIII.
 - (D) VII.
 - (E) X.
- 40 As alterações adquiridas da coagulação são muito mais frequentes na prática clínica do que os distúrbios congênitos e, muitas vezes, se associam a outras alterações da hemostasia, incluindo distúrbios plaquetários. Assinale a alternativa que contém a vitamina cuja deficiência influencia diretamente na produção de fatores da coagulação.
- (A) Vitamina K.
 - (B) Vitamina C.
 - (C) Vitamina D.
 - (D) Vitamina E.
 - (E) Vitamina A.
- 41 Nefropatia refere-se à designação genérica de doença renal. Entre todas as nefropatias, a insuficiência renal é a mais grave e a que produz maior impacto no organismo. Sobre a insuficiência renal crônica, assinale a alternativa correta.
- (A) Uma das funções endócrinas dos rins que é comprometida é a diminuição da secreção da vitamina K.
 - (B) O método mais efetivo para medir a taxa de filtração glomerular é a avaliação da creatinina sérica.
 - (C) Laboratorialmente, observa-se a diminuição dos níveis de ureia sérica.
 - (D) Um dos fatores que contribui para a progressão é o uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais.
 - (E) Laboratorialmente, observa-se diminuição do fator X.
- 42 A anemia é uma das complicações de maior impacto na vida dos pacientes com insuficiência renal, presente em 90% dos casos. Desenvolve-se secundariamente à _____. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
- (A) destruição das hemácias no baço.
 - (B) deficiência na produção de vitamina D.
 - (C) deficiência na produção de vitamina K.
 - (D) deficiência de eritropoietina.
 - (E) deficiência na produção de angiotensina.
- 43 O metabolismo e a eliminação de determinados medicamentos ficam alterados quando há falência renal. Na presença deste quadro clínico, assinale a alternativa em que consta o analgésico mais indicado.
- (A) Nimesulida.
 - (B) Paracetamol.
 - (C) Ácido acetil salicílico.
 - (D) Ibuprofeno.
 - (E) Diclofenaco.



- 44 A endocardite bacteriana é uma grave doença, considerada rara, que incide em 80% dos cardiopatas. Assinale a alternativa que contem a condição cardíaca com alto risco de desenvolver endocardite bacteriana, justificando, portanto, que os pacientes portadores realizem profilaxia antibiótica previamente aos procedimentos odontológicos cruentos.
- (A) Pacientes portadores de stent.
(B) Pacientes portadores de comunicação interatrial isolada.
(C) Pacientes portadores de prótese valvar.
(D) Prolapso da valva mitral sem regurgitação.
(E) Sopro cardíaco fisiológico.
- 45 Anticoagulantes são drogas que atuam em fatores de coagulação vitamina K dependentes, reduzindo a síntese e ação dos fatores II, VII, IX e X. Procedimentos odontológicos cirúrgicos precisam ser planejados de modo que o cirurgião-dentista tenha em mãos o controle da anticoagulação oral. Assinale a alternativa que apresenta o exame padrão ouro para avaliação dos efeitos anticoagulantes da varfarina sódica.
- (A) Tempo de tromboplastina parcial ativada.
(B) Razão normalizada internacional (INR).
(C) Tempo de protrombina.
(D) Contagem de plaquetas.
(E) Tempo de fibrinogênio.
- 46 A hipertensão arterial sistêmica não detectada ou mal controlada é um risco no atendimento odontológico, pois, a pressão arterial favorece o sangramento durante e após procedimentos cirúrgicos orais e também promove risco de complicações cardiovasculares. Assinale a alternativa que contém os valores máximos das pressões sistólicas e diastólicas para um atendimento odontológico eletivo.
- (A) 180 mm Hg/ 110 mm Hg.
(B) Abaixo de 140 mm Hg/ abaixo 90 mm Hg.
(C) 21 mm Hg/ 120 mm Hg.
(D) 20 mm Hg/ 100 mm Hg.
(E) 190 mmHg/ 100 mmHg.
- 47 A radioterapia é uma modalidade amplamente empregada no tratamento das neoplasias na região de cabeça e pescoço, seja como terapia primária, adjuvante à cirurgia, à quimioterapia ou de forma paliativa. Sobre os efeitos adversos orais da radioterapia, analisem-se as afirmativas.
- I. Além da diminuição do fluxo salivar, a radioterapia interfere na composição da saliva.
II. A diminuição do fluxo salivar promovida pela radioterapia limita-se ao tempo da terapia.
III. O laser de baixa potência é útil na prevenção de mucosite oral radioinduzida.
IV. Clinicamente, a osteoradionecrose caracteriza-se pela perda da mucosa de revestimento e exposição de osso necrótico por um período maior que duas semanas.
- Estão corretas
- (A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) I e II, apenas.



48 A eritroplasia é definida como uma mancha ou placa vermelha que não pode ser clínica ou patologicamente diagnosticada como qualquer outra condição. Sobre a eritroplasia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.

A maioria dos casos apresenta ao exame histopatológico displasia epitelial intensa, carcinoma *in situ*, ou carcinoma superficialmente invasivo.

Possui marcada predileção pelo gênero feminino.

Alguns casos de eritroplasia regredem sem tratamento.

Recorrência é um evento comum, após excisão cirúrgica.

A sequência correta é

(A) V – F – F – V.

(B) F – V – F – V.

(C) V – F – V – F.

(D) F – V – V – F.

(E) F – F – V – V.

49 A queilite actínica é uma condição potencialmente maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição crônica à luz ultravioleta. Assinale a alternativa que contém o aspecto histológico exclusivo da queilite actínica.

(A) Displasia epitelial.

(B) Tecido conjuntivo exibindo uma faixa acelular amorfa e basofílica.

(C) Infiltrado inflamatório crônico.

(D) Epitélio exibindo hiperqueratose.

(E) Epitélio exibindo acantose.

50 A metástase consiste numa invasão por células neoplásicas malignas a outros órgãos do corpo do indivíduo que, inicialmente, apresentava neoplasia em apenas um órgão. Sobre as metástases do carcinoma epidermoide bucal, assinale a alternativa correta.

(A) Ocorrem principalmente através dos vasos linfáticos para os linfonodos cervicais ipsilaterais.

(B) Ocorrem principalmente através dos vasos linfáticos para os linfonodos cervicais contralaterais.

(C) Ocorrem principalmente através dos vasos venosos para os pulmões.

(D) Ocorrem principalmente através dos vasos venosos para o fígado.

(E) Ocorrem principalmente através dos vasos linfáticos para o fígado.