



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2023 – PSRM 2023
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022
RESPOSTA(S) AO(S) RECURSO(S) CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 84
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER: A questão não deixa explícito se quer como resposta o tratamento de primeira ou segunda escolha, logo a resposta correta é a alternativa D – metronidazol e clindamicina, tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e pelo Tratado de Medicina de Família e Comunidade, como primeira e segunda escolha, respectivamente. Retificação de gabarito: D

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 86
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: De acordo com o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, volume 2, o tratamento antimicrobiano empírico sem a necessidade de exames complementares deve ser considerado para mulheres com sintomas indicativos de alta probabilidade de cistite não complicada, porém o caso em questão afirma cessação dos sintomas no momento da consulta, logo o tratamento empírico não é recomendado já que temos a ausência de sintomas, sendo indicada a orientação de retorno se recidiva do quadro.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 87
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: De acordo com o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, volume 2, o exame baciloscópico é o método prioritário do diagnóstico e do controle durante o tratamento de TB. Temos indicação de realização em pacientes sintomáticos, adultos que procuram os serviços de saúde espontaneamente ou por investigação do profissional de saúde, com queixas respiratórias ou com relato de tosse e expectoração há 3 semanas ou mais.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 89
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: De acordo com o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, volume 2, náuseas e vômitos são sintomas comuns apresentados pelos pacientes que buscam atendimento na Atenção Primária. A maioria das causas de náuseas e vômitos pode ser determinada pela história e pelo exame físico, dentro de um rol razoável de probabilidades. No entanto, é comum que em uma consulta de APS, a avaliação tenha como diagnóstico o sintoma e não a causa, principalmente nos episódios agudos. A história precisa descartar sinais de alerta, bem como diferenciar quadros agudos ou crônicos (mais de um mês de duração) e levar em consideração os fatores epidemiológicos de cada situação. O caso em questão solicita um sinal de alerta sem possibilidade de solução no momento da consulta na APS, relacionada a história clínica do paciente e os sintomas descritos no momento do atendimento realizado.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2023 – PSRM 2023
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 90
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER: De acordo com o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, volume 2, medidas comportamentais e/ou IBPs em dose plena são considerados teste terapêutico para pacientes com sintomas relacionados a doença do refluxo gastroesofágico, sendo as primeiras medidas preventivas a serem tomadas diante dos sintomas sugestivos. Alternativa correta: E.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 91
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER: Paciente hipertenso já apresenta risco cardiovascular alto, fazendo o cálculo, o paciente se beneficiaria fazendo uso da estatina, porém as mudanças no estilo de vida devem ser alvo em todas as consultas de acompanhamento, associadas as outras condutas. Alternativa correta: C.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 92
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história, das condições de vida do indivíduo e do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos. O teste de sensibilidade térmica é o primeiro a ser realizado e a primeira (sensibilidade térmica) a ser perdida nas lesões hansênicas.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 95
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: A entrevista inicial ao adolescente para evitar comportamentos de risco deve ser centrada na pessoa, acolhedora, empática, clara, simples, breve e flexível. O estabelecimento do vínculo é um dos aspectos mais importantes da entrevista. Deve-se evitar confrontos e julgamentos, apenas estimulando mudanças compatíveis com o estado motivacional da pessoa e utilizando-se o bom senso. Ações características do Método Clínico Centrado na Pessoa.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 96
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER: As causas mais comuns de fracasso de tratamento ou má resposta à terapia são dosagem inadequada da medicação, duração inadequada do tratamento ou não respeito ao tratamento. Nesse contexto, em que a paciente está tomando os remédios e teve tempo adequado para resposta, aumentar a dose de medicação de 10 mg para 20 mg seria o primeiro passo; as doses de medicação antidepressiva podem ser aumentadas após 4 semanas de tratamento, se a resposta for inadequada. O que não houve com a paciente em questão, sendo possível manter a dose e esperar sua evolução. Alternativa correta: A.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2023 – PSRM 2023
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 97
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: DIUs fornecem uma contracepção reversível altamente efetiva e são muito úteis para mulheres que desejam espaçar as gestações por vários anos. A inserção pós-parto, antes de 6 semanas, está associada a um risco maior de expulsão do DIU do útero, à medida que este involui. A amenorreia induzida pelo aleitamento fornece um alto nível de proteção contra a gravidez durante pelo menos os primeiros seis meses pós-parto, mas outra forma de contracepção deve ser usada depois de seis meses ou com o reinício da menstruação.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 98
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: É apropriado discutir suas preocupações com o seu paciente de uma forma não acusatória, sem julgamentos. Esperar que ela aborde o assunto pode resultar em mais abusos. A notificação de abuso de adultos competentes (não idosos) não é legalmente obrigatória na maioria dos países. Você deve oferecer assistência, avaliar sua segurança e fornecer-lhe informações sobre serviços disponíveis na área. Não há nenhuma razão para excluir uma diátese hemorrágica antes de abordar o tema de abuso.

ESPECIALIDADE: ACESSO DIRETO – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO: 99
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: A USPSTF atribui uma recomendação de nível A¹ ao rastreamento de câncer de colo, oferecido ou fornecido rotineiramente a todos os adultos acima de 50 anos. Há evidências insuficientes para recomendações contra ou a favor do rastreamento de rotina de câncer de pulmão, pele ou próstata. O rastreamento de aneurisma de aorta abdominal é recomendado para homens entre 65 e 75 anos de idade com história de tabagismo.