



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS  
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2023 – PSRM 2023  
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022  
RESPOSTA(S) AO(S) RECURSO(S) CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

|  |
|--|
| ESPECIALIDADE: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA |
| QUESTÃO: 6                                     |
| RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO               |

**PARECER:** Hipertireoidismo é relatado como fator de risco para osteoporose, entretanto hipotireoidismo não é condição causadora de osteoporose secundária. Na alternativa B : “Durante a investigação, a presença de cálcio e o exame de paratormônio elevados indicam a presença de hiperparatireoidismo primário”, o termo “elevados”(plural) faz referência que ambos - cálcio e paratormônio- estão elevados, indicativo de hiperparatireoidismo. Recurso indeferido. Referências:Manual brasileiro de osteoporose: orientações práticas para os profissionais de saúde / organização Adriana Orcesi Pedro , Perola Grinberg Plapler , Vera Lúcia Szejnfeld. -- 1. ed. -- São Paulo: Editora Clannad, 2021.Fuleihan GEH, Silverberg SJ. In: Primary hyperparathyroidism: Diagnosis, differential diagnosis, and evaluation. 2022. In: UptoDate [internet].Maeda SS, Silva DM, editors. Guia Prático em Osteometabolismo. São Paulo: Segmento Farma, 2014. Radominski, Sebastião César et al. Brazilian guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. Revista Brasileira de Reumatologia [online]. 2017, v. 57, suppl 2,pp s452-s466.

|  |
|--|
| ESPECIALIDADE: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA |
| QUESTÃO: 8                                     |
| RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO               |

**PARECER:** O exame de broncoscopia pode ser utilizado tanto para diagnóstico como para tratamento. Pela Broncoscopia pode-se biopsiar regiões pulmonares proximais e distais como Biópsias transbrônquicas e Criobiópsias. Não é o exame de escolha para diagnóstico de Pneumonia.Em casos de Hemoptise a Broncoscopia não é contraindicada, sendo rotineiramente indicada para diagnóstico e/ou tratamento do quadro.

|  |
|--|
| ESPECIALIDADE: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA |
| QUESTÃO: 9                                     |
| RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO               |

**PARECER:**  
O oxigênio e o dióxido de carbono se movem entre o ar e o sangue por difusão simples, isto é, de uma área de pressão parcial alta para outra de pressão parcial baixa. A lei de Fick (da difusão) afirma que a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área dessa lâmina, mas inversa à sua espessura. Na doença que acomete o interstício pulmonar há aumento da espessura local, levando a aumento da distância entre o ar do alvéolo e o sangue capilar, comprometendo trocas gasosas e determinando dispneia aos esforços.

|  |
|--|
| ESPECIALIDADE: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA |
| QUESTÃO: 16                                    |
| RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO               |

**PARECER:**  
A questão cita paciente com diagnóstico prévio de constipação intestinal crônica, que não evacuava há 12 dias e passou a evoluir com diarreia. No caso deve-se considerar a ocorrência de uma complicação da constipação intestinal crônica chamada Diarreia Paradoxal. Nessa situação, ocorre a formação de fecaloma (impactação fecal)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2023 – PSRM 2023  
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

na porção final do intestino/reto que causa irritação da mucosa levando à produção de grande quantidade de muco pelo tecido epitelial da região, que se assemelha a fezes diarreicas, e pode ser referido pelo paciente ou familiares como tal. Assim, após anamnese detalhada, o próximo procedimento ou exame mandatório é a realização do toque retal dentro do exame físico, considerado importante e simples manobra que auxilia na investigação diagnóstica deste paciente.

Freitas EV et al. Manual prático de geriatria. 2 ed. Capítulo 29: Constipação intestinal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017.

ESPECIALIDADE: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO: 18

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:** Ao se falar de critérios para auxiliar o diagnóstico das doenças Reumatológicas, deve-se lembrar que os critérios para Artrite Reumatóide (ACR/EULAR) são critérios de classificatórios, e não diagnóstico, sendo portanto um auxílio ao raciocínio clínico. Entretanto, o caso da questão, devido acometimento de interfalangeanas proximais, metacarpofalangeanas e punhos (sugere > 10 articulações acometidas), somado a alteração de provas inflamatórias (VHS > 50), e o tempo de doença (há 6 meses), o que daria 7 pontos para o critério de classificação para Artrite Reumatóide (ACR/EULAR 2010), e 5 critérios (ACR revisado 1987), confirmando o diagnóstico. A presença de nódulos em interfalangeana distal, não exclui o diagnóstico de Artrite Reumatóide, e a presença de osteoartrite no mesmo paciente, não faz desse diagnóstico a prioridade no tratamento da paciente, pois os sintomas clínicos atuais da paciente estão associados ao quadro articular da Artrite Reumatóide. Inclui-se como facilitador para o diagnóstico da doença a presença de erosão em 2ª metacarpofalangeana no raio-x de mão/punho.

MOTA, Licia Maria Henrique da *et al.* Diretrizes para o diagnóstico da artrite reumatoide. **Revista Brasileira de Reumatologia**, [S.L.], v. 53, n. 2, p. 141-157, mar. 2013. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1590/s0482-50042013000200003>.

ESPECIALIDADE: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO: 19

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:** Paciente com FRAX mostrando risco elevado para fratura de quadril, o que somado ao uso crônico de corticóide em doses altas (> 7,5 mg/dia), constitui indicação de introdução de bisfosfonato oral com reposição de Cálcio e vitamina D de acordo com avaliação clínica. Trata-se de conduta baseada nas diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticóide. Portanto apenas a detecção da osteopenia densitométrica com reposição de Cálcio e Vitamina D, não seriam o tratamento adequado para essa paciente.

Pereira, Rosa Maria Rodrigues et al. Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticóide. **Revista Brasileira de Reumatologia**. 2012, v. 52, n. 4, pp. 580-593. Disponível em: <>. Epub 07 Ago 2012. ISSN 1809-4570.